

**Primer registro de *Taraba major major*
(chororó) para la provincia de Misiones,
Argentina (Aves: Passeriformes: Formicariidae)**

Taraba major está representada por diez subespecies que se distribuyen desde el sudeste de México (*T. m. melanocrissus*) hasta el norte y centro de la Argentina (*T. m. major*) (Peters, 1951 *Check-list of birds of the world*, 7: 157-159).

El área de distribución del chororó abarca las tierras bajas del oeste del Paraguay, este y sur de Bolivia, sur y centro de Brasil y, en la Argentina, se lo encuentra en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, norte de Córdoba, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos (Peters, *op. cit.*; Ridgely & Tudor, 1994 *The birds of South America*: 222).

La siguiente nota tiene por objeto dar a conocer la presencia de *T. m. major* en Misiones, ya que hasta el presente este formicárido no había sido registrado en la citada provincia. El material de referencia se encuentra depositado en la colección ornitológica del Museo de La Plata, y se trata de un ejemplar capturado por M. Birabén en la localidad de San Pedro (26° 38' S, 54° 08' O), Depto. San Pedro, en diciembre de 1957. En la etiqueta del colector no figura el sexo del espécimen, pero por las características cromáticas de su plumaje no existen dudas de que se trata de un macho adulto.

Debido a que esta especie, al igual que el resto de los integrantes de la familia, frecuentan sotobosques densos, matorrales, cañaverales, claros y bordes de selvas, es muy probable que su distribución abarque la casi totalidad del territorio misionero.

Aníbal R. Camperi y Carlos A. Darrieu

División Zoología Vertebrados, Fac. Cs. Nat. y Museo
Paseo del Bosque, 1900 La Plata, Argentina
E-mail: acamperi@museo.fcnym.unlp.edu.ar