



● **AGUILUCHO ALAS ANCHAS (*Buteo platypterus*) EN LAS SERRANÍAS DE TARTAGAL, SALTA, ARGENTINA.** El 13 de diciembre de 2009, a las 09:50 h, 9 km al oeste de Salvador Mazza (22°03'31"S, 63°46'40"O, 840 msnm), departamento Gral. José de San Martín, durante 3 min observamos y fotografiamos un adulto y un juvenil de Aguilucho Alas Anchas (Fig. 1). Los individuos, junto a dos Milanos Plomizos (*Ictinia plumbea*) y un juvenil de Aguilucho Cola Corta (*Buteo brachyurus*), ascendían en una corriente térmica sobre una quebrada del bosque pedemontano. En Salta esta especie es considerada residente estival poco frecuente en el bioma de Yungas (Moschione et al. 2014), y esta es su primer mención y documentación en la Serranía de Tartagal (Coconier et al. 2007).

Luis G Pagano, Pablo G Grilli y Germán Marateo Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/n°, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. Grupo FALCO prysdr00@yahoo.com.ar

● **ÁGUIA-CINZENTA (*Buteogallus coronatus*) NO SUL DO PARANÁ, BRASIL.** Observei em 8 de maio de 2015 dois adultos do Águia-cinzenta no município de Palmas (26°33'S, 51°56'O), estado do Paraná, Brasil. As aves estavam sobrevoando em círculos ascendentes uma área de campo, quando um dos indivíduos apresentou um comportamento de "peneirar" durante aproximadamente 10 s (Fig. 2), aproveitando possivelmente o vento contrário para executar esta ação. A ave balançava verticalmente as pontas das asas, mantendo a cauda aberta em forma de "leque" e as patas estendidas, comportamento já verificado em Minas Gerais (Lombardi et al. 2012) e repetiu estes movimentos mais duas vezes. A Águia-cinzenta possui poucos registros no sul do Paraná, com observações antigas para Clevelândia e Coronel Domingos Soares (Kagiwara et al. 2001) e um registro para Palmas (Santos et al. 2009).

Jonas C Kilpp Grupo Coronatus: Rua Guilherme Kurtz 304, Passo Fundo, RS, Brasil. grupocoronatus@yahoo.com.br

● **PATO CRESTÓN (*Lophonetta specularioides*) EN VILLA EPECUÉN, BUENOS AIRES, ARGENTINA.** El 31 de julio de 2015, a las 16:10 h y en cercanías de Villa Epecuén (37°08'01"S, 62°48'00"O, 96 msnm), partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, observamos un grupo de nueve Patos Crestón nadando en una laguna temporaria pequeña (Fig. 3), junto a otras especies de patos. En la provincia de Buenos Aires su presencia es ocasional con sólo dos registros costeros, probablemente debido a los desplazamientos poblacionales durante los meses de invierno (Olrog 1963, Narosky & Di Giacomo 1993). Esta observación es la primera evidencia de Pato Crestón en el interior de la provincia de Buenos Aires, a 180 km del registro más cercano previamente conocido para la provincia.

Luis G Pagano y M Cecilia Chiale Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/n°, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. Grupo FALCO prysdr00@yahoo.com.ar

● **SIRIRÍ VIENTRE NEGRO (*Dendrocygna autumnalis*) REPRODUCIENDO EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.** El 28 de diciembre de 2016 observamos una pareja de Sirirí Vientre Negro con 12 pichones pequeños (Fig. 4), en un cuerpo de agua en las márgenes de la ruta nacional N° 188, a 10 km de la ciudad de General Villegas, provincia de Buenos Aires (34°59'24"S, 62°55'24"O). El Sirirí Vientre Negro contaba con algunos registros para la provincia de Buenos Aires, todos provenientes del noreste (Narosky & Di Giacomo 1993, Roda & Danti 2015, Sierra & Restivo 2015). No existen menciones previas de reproducción del Sirirí Vientre Negro para la provincia (de la Peña 2016).

Ignacio Roesler y Laura Fasola Aves Argentinas/Programa Patagonia, Departamento de Ecología, genética y Evolución, IEGEBA, Universidad de Buenos Aires (CONICET-UBA), Intendente Güiraldes s/n, Pabellón II, Ciudad Universitaria (C1428EHA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. kiniroesler@gmail.com

● **CARPINTERO OLIVA OSCURO (*Picoides fumigatus*) EN PURMAMARCA, JUJUY, ARGENTINA.** El 3 de agosto de 2011, a las 08:00 h, en el cruce de las calles Salta y Rivadavia de Purmamarca (23°44'50"S, 65°29'56"O, 2333 msnm), departamento Tumbaya, provincia de Jujuy, observé un macho de Carpintero Oliva Oscuro que se movía sobre unos algarrobos (*Prosopis* sp.) del predio de la Iglesia Santa Rosa de Lima. En Jujuy esta especie es mencionada para unas pocas localidades siempre en selva de Yungas (Camperi et al. 2012, Burgos et al. 2009). Esta observación es una nueva localidad para Jujuy y la primera realizada en la Prepuna.

Luis G Pagano Taller de Taxidermia, División Zoología Vertebrados, Museo de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP, Paseo del Bosque s/n°, La Plata (1900), Buenos Aires, Argentina. Grupo FALCO prysdr00@yahoo.com.ar



Figura 1. Aguiluchos Alas Anchas (*Buteo platyterus*) en la Serranía de Tartagal, Salta, el 13 de diciembre de 2009. **A:** Adulto; **B:** Juvenil. Fotografía: PG Grilli.



Figura 2. Adulto de Águila-cinzena (*Buteogallus coronatus*) con comportamiento de "peneirar", Palmas, Paraná (Brasil), 8 de maio de 2015. Fotografía: JC Kilpp.



Figura 3. Dos de los nueve Patos Crestón (*Lophonetta specularioides*) observados en cercanías de Villa Epecuén, partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires, el 31 de julio de 2015. Fotografía: LG Pagano.




Figura 4. Pareja de Sirirí Vientre Negro (*Dendrocygna autumnalis*) con 12 pichones, el 28 de diciembre de 2016, en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Fotografía: I Roesler.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BURGOS FG, BALDO JL & CORNELL FM (2009) *Lista de las aves de la provincia de Jujuy, Argentina*. Secretaría de Turismo y Cultura de Jujuy, San Salvador de Jujuy
- CAMPERI AR, DARRIEU CA, GRILLI PG & BURGOS F (2012) Avifauna de la provincia de Jujuy, Argentina: lista de especies (no Passeriformes). *Acta Zoológica Lilloana* 56 (1-2):82-140
- COCONIER EG, LÓPEZ LANÚS B, ROESLER I, MOSCHIONE F, PEARMAN M, BLENDINGER PG, BODRATI A, MONTELEONE D, CASAÑAS H, PUGNALI G & ÁLVAREZ ME (2007) Lista comentada de las aves silvestres de la unidad de gestión Acambuco. Pp. 32-102 en: COCONIER EG (ed) *Las aves silvestres de Acambuco, Provincia de Salta, Argentina*. Temas de Naturaleza y Conservación N° 6, AA/AOP, Buenos Aires
- DE LA PEÑA MR (2016) Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución. Rheiidae a Pelecanoididae. *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie)* 19(1):1-456
- KAGIWARA D, URBEN-FILHO A & MORATO AS (2001) Dois registros recentes de águia-cinzena (*Harpyhaliaetus coronatus*) no Estado do Paraná. Pp. 104 en: STRAUBE FC (ed) *Ornitologia sem fronteiras e resumos IX Congresso Brasileiro de Ornitologia*. Fund. O Boticário de Proteção a Natureza, Curitiba
- LOMBARDI VT, SANTOS KK, NETO SD, MAZZONI LG, RENNÓ B, FAETTI, RG, EPIFÂNIO AD & MIGUEL M (2012) Registros notáveis de aves para o Sul do Estado de Minas Gerais, Brasil. *Cotinga* 34:32-45
- MOSCHIONE F, SPITZNAGEL O & GONZÁLEZ M (2014) *Lista de aves de Salta*. Gobierno de la Provincia de Salta, Ministerio de Cultura y Turismo, Salta
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini & L.O.L.A, Buenos Aires
- OLROG CC (1963) Lista y distribución de las aves argentinas. *Opera Lilloana* IX:1-377
- RODA MA & DANTI CF (2015) Nuevos registros de aves para Saladillo, provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 60:32-38
- SANTOS REF, SCHERER-NETO P & ALBUQUERQUE JLB (2009) Gaviões: Família Accipitridae. Pp. 167-196 en: IAP/PROJETO PARANÁ BIODIVERSIDADE. *Planos de Conservação para espécies de Aves Ameaçadas no Paraná*. IAP/Projeto Paraná Biodiversidade, Curitiba
- SIERRA E & RESTIVO C (2015) El Sirirí Vientre Negro (*Dendrocygna autumnalis*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 60:73-74