

APUNTES ICTIOLOGICOS DE LA LAGUNA DE LOBOS
(Pcia. Bs. As.)

Hugo López
ILPLA - Paseo del Bosque s/n - 1900 La Plata - Buenos Aires

La ictiofauna de la laguna de Lobos se conoce parcialmente a través de los datos de Aramburu y Meni (1967), Ringuelet *et al.* (1967) y Freyre (1976). Como resultado del relevamiento efectuado por integrantes de la Sección Ictiología del Instituto de Limnología "Dr. Raúl A. Ringuelet", dentro del programa "Estudio hidrobiológico de la laguna de Lobos y su cuenca", se comprobó la presencia de 22 especies pertenecientes a 13 familias ubicadas en 6 órdenes.

Superorden CLUPEOMORPHA

Orden Clupeiformes

Familia Clupeidae: *Ramnogaster melanostoma limnoica* (mandufia)

Superorden OSTARIOPHYSI

Orden Cypriniformes

Suborden Characoidei

Familia Characidae

Subfamilia Cheirodontinae: *Cheirodon interruptus interruptus* (mojarrita)

Subfamilia Tetragonopterinae: *Astyanax fasciatus* (mojarra)

A. eigenmanniorum (mojarra)

Bryconamericus iheringi (mojarra)

Hyphesobrycon anisitsi (mojarra)

Subfamilia Glandulocaudinae: *Pseudocorinopoma doriai* (mojarra de velo)

Subfamilia Acestrorhynchinae: *Oligosarcus jenynsi* (dientudo)

Familia Erythrinidae: *Hoplias malabaricus* (tararira)

Familia Curimatidae: *Curimata gilberti* (sabalito)

Suborden Cyprinoidei

Familia Cyprinidae: *Cyprinus carpio* (carpa)

Orden Siluriformes

Familia Pimelodidae: *Parapimelodus valenciennesi* (bagarito)

Pimelodella laticeps (bagre cantor)

Rhamdia sapo (bagre sapo)

Familia Callichthyidae: *Corydoras paleatus* (tachuela)

Familia Loricariidae: *Hypostoma commersoni* (vieja de río)

Loricaria anus (vieja)

Superorden ATHERINOMORPHA

Orden Atheriniformes

Suborden Cyprinodontoidei

Familia Jenynsiidae: *Jenynsia lineata lineata* (madrecita)

Familia Poeciliidae: *Cnesterodon decemmaculatus* (madrecita)

Suborden Atherinoidei

Familia Atherinidae: *Basilichthys bonariensis bonariensis* (pejerrey)

Superorden ACANTHOPTERIGII

Orden Synbranchiformes

Suborden Synbranchoidei

Familia Synbranchidae: *Synbranchus marmoratus* (anguila criolla)

Orden Perciformes

Suborden Percoidei

Familia Cichlidae: *Cichlasoma faceatum* (chanchita)

Las novedades se refieren a la presencia de *Astyanax fasciatus*, *Hypostomus commersoni* y *Cyprinus carpio*, el hallazgo de esta última especie no hace más que confirmar su avance y colonización de los ambientes acuáticos en la provincia de Buenos Aires. Datos y comentarios sobre la misma pueden verse en Mac Donagh (1945 y 1948), Mastrarrigo (1948) y Ringuélet (1966). Barla e Iriart (1987), opinan que la presencia de *Cyprinus carpio* en la laguna de Chascomús podría producir serios problemas en las poblaciones nativas y el hecho de que esta especie pertenece a un tipo ecológico ausente en el sistema favorecería la colonización de la laguna, así como las restantes de la cuenca.

BIBLIOGRAFIA

- Aramburu, R. H. y R. C. Menni, 1967. Composición a nivel específico e intraespecífico de la fauna íctica de lagunas "piloto" de la pampasia bonaerense. En: *Trabajos Técnicos, 2da. etapa (1966). Convenio de Riqueza Ictícola*. La Plata (mimeografiado).
- Barla M. J. y R. Iriart, 1987. La presencia de la carpa *Cyprinus carpio* L. (Osteichthyes: Cypriniformes) en la laguna de Chascomús y su significado. *Limnobiós*, 2 (9): 685-686.
- Freyre, L., 1976. La población de pejerrey de la laguna de Lobos. *Limnobiós*, 1 (4): 105-128.
- Mac Donagh, E. J., 1945. Pesca de una "carpa de espejuelos" en el Río de la Plata. *Not. Mus. La Plata, Zool.*, 10 (89): 315-324.
- Mac Donagh, E. J., 1948. Sobre la cría de carpas y pejerreyes en la provincia de San Luis. *Not. Mus. La Plata, Zool.*, 13 (114): 313-325.
- Mastrarrigo, V., 1948. La carpa. El peligro de su difusión en el país. *Bol. Dir. Gral. Pesca, Nro. 1*.
- Ringuélet, R. A., 1966. La introducción de peces exóticos en la Argentina. *Bol. Dir. Rec. Pesqueros (Pcia. Bs. As.), Nro. 5*. 40 pp.
- Ringuélet, R. A., R. H. Aramburu y A. A. de Aramburu, 1967. *Los peces argentinos de agua dulce*. Ed. Com. Inv. Cient. (Pcia. Bs. As.). 602 pp.