

29 ABR 1926

CABRERA-28

A. CABRERA

DOS ARDILLAS EXÓTICAS NUEVAS



Extracto del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL.
Tomo xvii, 1917 (páginas 516-519).

MADRID, 1917

220 463

Dos ardillas exóticas nuevas

por

Ángel Cabrera.

En mi *Lista de los mamíferos de las posesiones españolas del Golfo de Guinea*, publicada en el primer tomo de las *Memorias* de nuestra Sociedad, indiqué la sospecha de que el *Heliosciurus rufobrachiatus* del territorio del Muni fuese una subespecie distinta de la forma típica de Fernando Póo. Ahora, gracias al distinguido africanista D. Juan Bravo Carbonel, que ha tenido la atención de enviarme el verdadero *rufobrachiatus* desde Santa Isabel, aquella sospecha ha quedado confirmada. Las dos ardillas son, dentro de los límites de la especie, muy diferentes. La forma continental es bastante más chica que la insular (pie posterior, de 50 a 53 milímetros en aquélla, de 56 a 60 en ésta) y tiene el pelaje mucho más rojo, diferencia que se observa muy notablemente en la cola. Los pelos de este apéndice, que en la forma típica son negros con estrechos anillos blancos o amarillentos, en la ardilla del Muni son negros también, pero con los anillos naranja y sólo la puntita amarillenta. Yo había pensado que esta raza podría ser la «var. *Waterhousei*», creada por Gray para los ejemplares oscuros con anillos amarillos en los pelos de la cola (1), pero como Gray no indica la patria de esta variedad, ni señala para la especie en general más localidad que Fernando Póo, lo más verosímil es que se refiera a los ejemplares de la isla de pelaje algo más obscuro que lo normal. El hecho es tanto más de notar, cuanto que el autor, en el mismo trabajo, siempre que una de sus «varieties» procede de diferente localidad que el tipo, tiene buen cuidado de advertirlo. El nombre de *aubryi* tampoco conviene a la ardilla del Muni, pues aun en el supuesto de que el ejemplar así llamado por Milne-Edwards sea un individuo joven del grupo *rufobrachiatus*, lo que está todavía por comprobar, la localidad típica de *aubryi* es el Gabón, y las ardillas

(1) *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, ser. 3.^a, xx, 1867, pág. 328.



de dicha especie en esta región ofrecen un matiz más pardo, menos rojo, debido a que la porción oscura de los pelos es más bien parda oscura que negra (1). *Sciurus maculatus* Temminck es la raza de la Costa de Oro; un ejemplar de Winnebah que el Museo Nacional de Ciencias Naturales obtuvo de Boucard, era muy diferente de los del Muni, con un marcado matiz pajizo en el dorso y la cola, las partes inferiores más bien amarillas que rojas, y sólo la parte roja de los miembros posteriores de un color de cobre muy encendido. En cuanto a la forma *libericus*, el profesor Miller, al describirla (2), ha señalado ya sus diferencias con la que vive en la región del Muni. Creo, pues, que no queda otro recurso que designar ésta con un nuevo nombre, que es el del pueblo indígena de la localidad donde fueron obtenidos el tipo y los paratipos.

***Heliosciurus rufobrachiatus bengalensis* subsp. n.**

Parecido a la subespecie típica, pero más pequeño y con las partes superiores más rojizas, extendiéndose este matiz sobre la cola en toda la extensión de la misma, en vez de limitarse a la base.

Caracteres. Pelo de las partes superiores anillado de negro y naranja de capuchina, resultando una mezclilla en la que predomina el negro, y cuyo conjunto, desde lejos y a primera vista, es pardo momia algo rojizo. Hacia los miembros, y en la parte anterior de la cabeza, los anillos naranja pasan gradualmente al amarillo anaranjado pálido; pero en los lados de la cara son del mismo color que en el dorso, nunca blancuzcos, como ocurre en muchos ejemplares del verdadero *rufobrachiatus*. La parte interna de los miembros y el borde posterior de los brazos varían entre rojizo naranja y pardo Sanford. Los cuatro pies, por encima, ofrecen una mezclilla de naranja ocráceo y negro, predominando el negro, y en las partes inferiores se presentan los mismos dos colores, pero con predominio

(1) Huet dice de una ♀ del Gabón, en su revisión de las ardillas africanas (*Nouv. Arch. du Muséum*, sér. 2.^a, III, 1880, pág. 145): «Tête, joues, dos et parties externes des membres brun foncé tiqueté de jaune», y en la descripción general de la especie, basada principalmente sobre ejemplares de dicha localidad, dice que los pelos de las partes superiores son «brun foncé annelés de jaune plus ou moins roux.» Nótese que Huet, que estudió ejemplares gaboneses de diferentes edades y vió también el tipo de *Sciurus aubryi*, considera a éste como una especie distinta de aquéllos.

(2) *Proc. Washington Acad. Scienc.*, 1900, pág. 633, fig. 39.

muy considerable del matiz ocráceo, pues el negro está reducido a un solo anillo muy estrecho en cada pelo. En algunos ejemplares, el centro de la garganta es blanco, y otros tienen blanca también la región pubiana y hasta la línea media del vientre. Los pelos de la cola son negros con la base de un color ante ocráceo claro, después tres anillos anaranjados de capuchina, y la punta, a continuación de una ancha extensión negra, de color crema. El conjunto resulta mezclado de negro y naranja con tendencia a formar fajas confusas, y un borde crema en los dos últimos tercios. Incisivos superiores de color rojo vinoso; los inferiores naranja asalmonado.

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo, 228 mm.; cola, 245; oreja, 14; pie posterior, sin uñas, 52.

Cráneo: longitud total, 54 mm.; longitud cóndilobasal, 48; ancho cigomático, 31; ancho interorbitario, 17; estrechamiento postorbitario, 18; diastema, 11,7; mandíbula, 32; serie molar superior, 10,3; serie molar inferior, 10.

Tipo. Macho adulto, del cabo San Juan (Guinea Española), obtenido en 1901 por D. Manuel M. de la Escalera. Museo Nacional de Ciencias Naturales, núm. 1.128; núm. original, 26.

He examinado otros siete ejemplares, tres machos y cuatro hembras, topotipos obtenidos por el mismo colector.

Aprovecho esta oportunidad para dar a conocer una ardilla malaia, que me parece muy diferente de cuantas hasta ahora se han descrito del Asia oriental. Perteneció al género *Callosciurus*, y fué adquirida de la casa Rolle, de Berlín, como *Sciurus griseogularis* Gray; pero por más que he buscado no he podido hallar este nombre en ningún trabajo de Gray, en el *Catalogus Mammalium* de Trouessart, ni en ninguno de los numerosos trabajos que sobre ardillas asiáticas han publicado Anderson, Jentink, Thomas y Bonhote. Creo, pues, que se trata simplemente de un nombre de catálogo comercial, y al indagar cuál podría realmente aplicarse al ejemplar en cuestión, es cuando he visto que no le convienen los caracteres de ninguna de las formas conocidas, en vista de lo cual me ha parecido lo más conveniente describirlo como cosa nueva, dándole un nombre más eufónico y que recuerde mejor uno sus caracteres más salientes.

***Callosciurus erubescens* sp. n.**

Parecido en su aspecto general al *C. atrodorsalis*, pero en vez de tener una zona dorsal negra, ofrece en todo el lomo un fuerte

matiz rojo, y sus partes inferiores son grises con una mancha negra en la parte alta del pecho.

Caracteres. Pelo del dorso de color pizarra en la base, y luego negro con dos anillos naranja ocráceo, resultando a primera vista un conjunto de matiz intermedio entre pardo ámbar y pardo Argos. Hacia los flancos, los hombros y los muslos, los anillos claros del pelo pasan gradualmente a amarillo cadmio, y en la cabeza, antebrazos y piernas a amarillo de maíz, de modo que estas partes son más amarillas que el lomo. En los cuatro pies, la mezcla de colores es mucho más fina, y el color claro es un crema muy pálido, casi blanco, por lo que el conjunto resulta ceniciento. Toda la superficie abdominal, desde la mandíbula al ano, y la cara interna de los miembros, ofrecen un matiz gris pizarra claro, teniendo los pelos la base más oscura, y en medio del pecho hay algunos pelos enteramente negros que forman una mancha estrecha, y como de un par de centímetros de larga. Los pelos de la cola están profusamente anillados de negro y amarillo de ante, tirando este último color a naranja ocráceo en la parte próxima al cuerpo, mientras hacia la extremidad pasa a color crema. No hay el menor indicio de la porción terminal negra que caracteriza a *C. gordonii*, *C. concolor* y tantas otras ardillas orientales.

Dimensiones del tipo: cabeza y cuerpo, 220 mm.; cola, 150; pie posterior, 48.

Por desgracia, el ejemplar fué hecho naturalizar antes de descubrirse que podía representar una forma nueva, y no es posible tomar las medidas del cráneo.

Tipo. Individuo adulto obtenido en Selangor por J. Waterstradt, en Mayo a Junio de 1900. Museo Nacional de Ciencias Naturales, número 1.669.

