

29 ABR 1926

CABRERA-24

ANGEL CABRERA

UNA NUEVA ARDILLA DE GRECIA



EXTRACTO DEL BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL
Tomo XXIV, 1924 (páginas 419 a 421).

MADRID, 1924

P^o no 456

Una nueva ardilla de Grecia

por

Angel Cabrera.

En un viaje que por la Europa central y meridional han hecho, durante el pasado verano, el Dr. J. Goyanes y el Vicesecretario de nuestra SOCIEDAD, Sr. Bolívar y Pieltain, ha obtenido el segundo, en el monte Olimpo, cinco ejemplares de *Sciurus* sumamente interesantes, no sólo por proceder de una región cuyos ma-

¹ Cavanilles (t. I, páginas 205-204), Cortázar (pág. 178), Vilanova (página 120), Calderón (t. I, pág. 385), Viles (pág. 13) y otros autores se han ocupado de estas salinas, haciendo una detallada descripción de las mismas y de su producción.

míferos nos son casi desconocidos, sino porque a todas luces representan una forma diferente del *Sciurus vulgaris lilaus* Miller¹, descrito del monte Parnaso. Tratándose de una especie tan proteica como la ardilla común, nada tiene de extraordinario que se encuentren dos formas distintas en dos macizos montañosos completamente aislados, y separados entre sí por el extenso valle de la Tesalia; pero el caso merece nuestra atención, porque es como un síntoma de las sorpresas que nos reserva la fauna mastozoológica de la Europa sudoriental.

La ardilla del monte Olimpo es, como la del Parnaso, una subespecie de pequeño tamaño y pelaje muy oscuro; pero no presenta en ninguna parte los matices ocre que en los flancos y extremidades ofrece la forma *lilaus*. Al describir como nueva la forma olímpica, considero un honor el poderla dedicar a D.^a Amelia Goyanes de Bolívar, esposa del colector e hija del organizador de la excursión.

***Sciurus vulgaris ameliae* subsp. n.**

Diagnosis.—Una forma subespecífica parecida a *S. v. lilaus* en el tamaño y en la coloración oscura, pero con el color de las partes superiores más uniforme, y sin matices ocre en los flancos ni extremidades.

Descripción.—Color de las partes superiores, en el pelaje estival, pardo muy oscuro, entre pardo Prout y pardo momia, pasando ligeramente a pardo oliváceo sobre la cabeza, y tirando a gris en las mejillas. Cada pelo está muy finamente anillado de color de ante oscuro sobre negro. Las extremidades, del color del dorso. Partes inferiores de un blanco muy levemente lavado de crema. Cola negro-fusca, con la base de los pelos, que se ve mucho por debajo, de un pardo ante.

Uno de los ejemplares presenta cierta tendencia al melanismo; los anillos ante de los pelos están casi desvanecidos, y por consecuencia, la coloración se inclina al negro fusco.

El cráneo es relativamente estrecho y ligero, como en todas las razas pequeñas.

Dimensiones: pie posterior, reblandecido, 62 mm. Cráneo: longitud total, 51; longitud cóndilobasal, 48; nasales, en la sutura, 16; diastema, 13; ancho cigomático, 32; ancho postorbitario, 17; an-

¹ *Ann. and Mag. Nat. Hist.*, ser. 7.^a, XX (1907), pág. 429.

cho de la caja cerebral, 24; mandíbula, 33; serie dental superior, 10,8; serie dental inferior, 10.

Tipo.— Hembra adulta, en piel, obtenida el 3 de septiembre de 1924 en el monte Olimpo (Grecia), cerca de Kontinopló, a unos 1.000 m. de altura y en bosque de pino. Núm. 24. X. 25. 1 del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

El tipo carece de cráneo, teniendo solamente el extremo de las mandíbulas adherido a la piel, por lo que las dimensiones craneanas han sido tomadas sobre otro ejemplar del mismo tamaño (número 24. X. 25. 2).

Desgraciadamente, no habiendo ido el Sr. Bolívar y Pieltain preparado para la recolección de mamíferos, los ejemplares obtenidos llegaron al Museo en un lamentable estado, y sólo ha sido posible incluir en las colecciones del mismo, además del tipo, el individuo afectado de melanismo y los cráneos de otros dos.

