

Dr. HUGO L. LOPEZ



PROVINCIA DE BUENOS AIRES  
MINISTERIO DE ASUNTOS AGRARIOS

ENUMERACION SISTEMATICA  
DE LOS VERTEBRADOS DE LA  
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por

RAUL A. RINGUELET Y RAUL H. ARAMBURU



# ENUMERACION SISTEMATICA DE LOS VERTEBRADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Por

RAUL A. RINGUELET - RAUL H. ARAMBURU

Más de 30 años han pasado desde que el doctor Carlos A. Marellí publicó, en 1924, el «Elenco sistemático de la Fauna de la provincia de Buenos Aires (Procordados y Vertebrados)».


El adelanto de los conocimientos zoológicos, durante el lapso transcurrido, es más que suficiente como para envejecer un catálogo faunístico. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la necesidad de editar una lista al día se hace cada vez más urgente. Recientemente se han aprobado nuevas leyes de caza y de pesca, y el interés del pueblo por las actividades deportivas en esos ámbitos, ha tomado nuevos impulsos. A tono con esa nueva manera de enfocar los problemas de la Naturaleza, el Gobierno de la Provincia ha creado una Dirección de Conservación de la Fauna. Por todo ello, es menester tener a mano los nombres, si se quiere «oficiales», de las especies consideradas plaga, de las especies dañinas o perjudiciales según el criterio humano, y de las de importancia económica. Por otra parte, los censos de la fauna de un país o región cualquiera, constituyen una suerte de codificación de la Naturaleza, como paso previo e indispensable para un ensayo racional de aprovechamiento de las riquezas naturales y de su adecuada conservación. Desde fines del siglo XVIII se ha dicho, y lo han repetido en nuestro medio, Cosme Argerich, Alberto Palcos y otros estudiosos y científicos, que un Código de la Naturaleza es indispensable para la libertad de una nación.


La enumeración presente considera todas las especies de Vertebrados halladas o citadas dentro de los límites de la Provincia, salvo los peces marinos. Comprende los nombres científicos válidos y los nombres vernáculos o librescos más adecuados, ordenados de acuerdo con las clasificaciones que los autores conceptúan más serias.

Indicase sucintamente la distribución geográfica, prefiriéndose aludir a los dominios zoogeográficos, según las conclusiones recientes de Ringuelet (1955), modificando el esquema clásico de los territorios zoogeográficos argentinos, aceptados hasta ahora como resultado de la obra de Holmberg, Lahille y Cabrera.

Las especies censadas son 158 peces en sentido amplio, 24 batracios, 48 reptiles, 393 aves y 105 mamíferos, lo que hace un total de 728 especies de Vertebrados.

Al final de la lista sistemática se agrega un índice de nombres vulgares, cada uno de los cuales lleva uno o más números que permiten encontrar la especie correspondiente dentro de cada grupo.





REFERENCIAS

MAPA DE REFERENCIA PARA LA DISTRIBUCION DE LAS AVES

## OBSERVACIONES SOBRE DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Con el objeto de sintetizar en lo posible la zoogeografía de cada especie, son oportunas unas breves nociones generales de referencia.

La presencia y ausencia de grupos animales, su fidelidad respecto de ambientes definibles (fauna de altura, fauna de selva, etc.), ha permitido dividir el mundo en REGIONES ZOOGEOGRAFICAS. Refiriéndonos exclusivamente a las regiones terrestres, la REGION NEOTROPICAL o NEOTROPICA cubre toda la América Central y la América del Sur. Esa región se divide, a su vez, en dos subregiones: GUAYANO - BRASILEÑA (con típica fauna hílea o selvática) y la subregión AUSTRAL o PATAGONICA o CHILENO - PATAGONICA (con fauna típica erémica, de llanura y de montaña). La primera de las dos cubre todo el norte y nordeste de la República Argentina y baja en una lengua comprendiendo la margen santafesina del río Paraná, y una franja de la provincia de Buenos Aires, aledaña al Río de la Plata, hasta aproximadamente el partido de La Plata. La segunda cubre todo el resto de la República y, por ende, la mayor parte de la provincia de Buenos Aires.

Cada subregión divídese, a su vez, en DOMINIOS, como se ve en el mapa número 1, y ellos son:

DOMINIO SUBTROPICAL. Unico de la subregión guayano-brasileña que corresponde a la Argentina y a nuestra provincia.

DOMINIO AUSTRAL - CORDILLERANO.

DOMINIO CENTRAL.

DOMINIO PAMPASICO.

DOMINIO PATAGONICO.

A la provincia de Buenos Aires le corresponden cuatro dominios, que son:

1. El SUBTROPICAL ya mencionado, con vegetación arbórea y elevado promedio de lluvias.
2. El PAMPASICO, correspondiente a la estepa herbácea o pampa bonaerense.
3. El PATAGONICO, que va del río Colorado al Negro, o Patagonia bonaerense.
4. El dominio CENTRAL, comprendiendo el territorio bonaerense desde el río Colorado a Bahía Blanca con el sistema serrano meridional o Ventania, y la parte interpuesta entre él y Bahía Blanca. Incluye también las áreas adyacentes a la provincia de La Pampa. Este dominio tuvo vegetación de monte, que en la actualidad ha desaparecido en su mayor parte.

Como es de suponer, la distribución de los animales no puede coincidir con exactitud con las líneas que sobre el mapa establece el hombre, pero la realidad de esos territorios es perfectamente válida. Existen «engranajes» entre territorio

y territorio, y los animales con capacidad de traslación activa, como las aves, se ubican más difícilmente en cualquier tipo de esquema zoogeográfico.

Para todos los grupos catalogados («peces» de agua dulce, batracios, reptiles y mamíferos), menos las aves, señalamos sintéticamente su distribución aludiendo a los dominios antes nombrados. En cambio, para las aves, dadas sus particularidades corológicas, hacemos referencia a cuatro zonas o áreas: 1, 2, 3 y 4, que se indican en el mapa número 2. La primera posee ornitofauna de tipo subtropical, la segunda tiene aves predominantemente «centrales», la cuarta, fauna de aves especialmente patagónica, y el área tercera, es intermedia o de transición, con desborde de la fauna de las demás zonas circundantes.

En cualquier caso se omiten las indicaciones sobre distribución general de cada especie en el resto del país, aludiendo siempre, y exclusivamente, a su presencia en la provincia de Buenos Aires.

## Subphylum VERTEBRADOS o CRANEADOS

### (*Vertebrata* o *Craniata*)

Hoy día los Vertebrados o Craneados se clasifican en 10 (ó 9) clases con representantes vivientes, de las cuales las 5 (ó 4) primeras se denominan colectivamente Vertebrados Pisciformes, y las 4 últimas (batracios, reptiles, aves y mamíferos) Vertebrados Tetrápodos. Mientras que la taxinomía general de estos últimos es aceptada universalmente, hay divergencias importantes respecto del número y ámbito de las superclases, clases y órdenes de Vertebrados Pisciformes.

#### CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LOS VERTEBRADOS PISCIFORMES

Como es sabido, con la palabra «peces» se designan, en sentido amplio, todos los vertebrados pisciformes. En las clasificaciones modernas los Vertebrados agnatos, o sin mandíbula, se colocan aparte, con una o dos clases con formas vivientes; son las babosas y lampreas, distinguibles por la falta de mandíbula, la boca circular y la ausencia de aletas pares entre otros caracteres. Peces o *Pisces*, según los diferentes ictiólogos, son: una serie comprendiendo todos los Vertebrados pisciformes con mandíbula (Elasmobranquios, Dipnoos y Teleóstomos), o bien una clase única caracterizada principalmente por su esqueleto óseo, la monorrinia y otros detalles anatómicos, equivaliendo a Teleóstomos. Adóptase aquí la taxinomía general de Leo S. Berg (1940), con respecto a los órdenes, y en grupos de menor jerarquía la ordenación de familias y subfamilias utilizada por los ictiólogos que se ocupan de la fauna neotrópica, como Schultz, Fowler y otros.

Según se ha analizado recientemente (Ringuélet, 1955), en el territorio de la provincia de Buenos Aires, la distribución de los peces en las aguas interiores sigue, en general, el mismo esquema que toda la limnofauna. La ictiofauna bonaerense, de acuerdo a los estudios de MacDonagh (1934), es paladinamente subtropical hasta Bahía Blanca, siendo una extensión de la fauna parano-platense, pero enormemente empobrecida. De este modo, los peces dulciacuícolas se ubican en dos grandes conjuntos faunísticos:

- a) Ictiofauna parano-platense, subtropical, en toda la Provincia hasta Ventania y cercanías de Bahía Blanca;
- b) Ictiofauna patagónica, desde el río Colorado al extremo sur.

Sobre esta distribución global, hay fundadas razones para diferenciar el Río de la Plata, el Paraná y el Delta, junto con la franja rioplatense de la Provincia con ambientes acuáticos en la inmediata vecindad de aquéllos, extensión

en donde la ictiofauna mantiene la misma riqueza de familias, géneros y especies que en la gran vía faunística Paraná - Plata, mientras que fuera de esta extensión, la plana bonaerense hasta Ventania tiene un número restringido de grupos. Algunos grupos más se extienden hasta la cuenca del río Salado.

Cuando se indica la distribución geográfica comprende el río Paraná y el estuario del río de la Plata, se indica simplemente Paraná - Plata; para distribuciones más detalladas se aclara con mayor precisión.

Las abreviaturas Ie, Rc, Rh, Ric, Ril y Ro significan, respectivamente: Importancia económica, Régimen carnívoro, Régimen herbívoro, Régimen ictiófago, Régimen iliófago y Régimen omnívoro.

Superclase AGNATOS (*Agnatha*)

Clase PETROMIZONES o MARSIPOBRANQUIOS (*Petromyzones* o *Marsipobranchii*).

Orden PETROMIZONIFORMES (*Petromyzoniformes*).

Familia PETROMIZONIDOS (*Petromyzonidae*).

Subfamilia GEOTRININOS (*Geotriininae*).

1. *Geotria australis* Gray, 1851.

Lamprea de bolsa. Bandera argentina.

Distr.: Río de la Plata, río Negro. Anadroma.

Superclase GNATOSTOMADOS (*Gmathostomata*).

Serie PECES (*Pisces*).

Clase ELASMOBRANQUIOS (*Elasmobranchii*).

Subclase SELACIOS o EUSELACIOS (*Selachii* o *Euselachii*).

Superorden BATOIDEOS o HIPOTREMADOS (*Batoidei* o *Hypotremata*).

Orden RAIIFORMES (*Rajiformes*).

Familia PARATRIGONIDOS (*Paratrygonidae* = *Potamotrygonidae*).

2. *Paratrygon hystrix* (Müller y Henle, 1841).

Raya de río. Chucho de río. Ie. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

3. *Paratrygon motoro* (Müller y Henle, 1841).

Raya de río. Chucho de río. Ie. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

Clase DIPNOOS o DIPNEUSTAS (*Dipnoi* o *Dipneusta*).

Superorden CERATODOS (*Ceratodi*).

Orden LEPIDOSIRENIFORMES (*Lepidosireniformes*).

Familia LEPIDOSIRENIDOS (*Lepidosirenidae*).

4. *Lepidosiren paradoxa* (Fitzinger, 1837).

Lepidosirena. Lolocho.

Distr.: Ocasional en el Paraná inferior (San Pedro).

Clase TELEOSTOMOS (*Teleostomi*).

Subclase ACTINOPTERIGIOS (*Actinopterygii*).

Orden CLUPEIFORMES o ISOSPONDILOS (*Clupeiformes* o *Isospondyli*).

Suborden CLUPEOIDEOS (*Clupeoidei*).

Familia CLUPEIDOS (*Clupeidae*).

5. *Clupea melanostoma* (Eigenmann, 1907).

Sardina. Mandufia. Ie.

Distr.: Paraná - Plata y nordeste de la Pcia. hasta la cuenca del Salado.

6. *Ilisha flavipinnis* (Valenciennes, 1839).

Lacha. Ie. Ric.

Distr.: Paraná - Plata.

~~.....~~ ).  
Sardina de río. Ie.

Distr.: Río de la Plata.

Familia ENGRAULÍDOS (*Engraulidae*).

8. *Lycengraulis olidus* (Günther, 1874).

Anchoíta de río. «Sardina». Ie. Ric.

Dist.: Paraná - Plata.

Orden CARACIFORMES o HETEROGNATOS. (*Characiformes* o *Heterognathi*).

Suborden CARACOIDEOS (*Characoidei*).

Familia TETRAGONOPTERIDOS (*Tetragonopteridae*).

Subfamilia TETRAGONOPTERINOS (*Tetragonopterinae*).

9. *Astyanax abramis* (Jenyns, 1842).

Mojarra. Mojarra pacusa. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

10. *Astyanax bimaculatus bimaculatus* (L., 1758).

Mojarra. Rc.

Distr.: Paraná - Plata.

11. *Astyanax erythropterus* (Holmberg, 1887).  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Río Paraná.
12. *Astyanax fasciatus fasciatus* (Cuvier, 1819).  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Toda la provincia hasta Ventania.
13. *Astyanax lineatus* (Perugia, 1891).  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
14. *Bryconamericanus iheringi* (Boulenger, 1887).  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
15. *Hemigramus caudovittatus* Ahl., 1924.  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
16. *Hemigramus matei*. Eigenmann, 1907.  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
17. *Markiana nigripinnis* (Perugia, 1891).  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
18. *Tetragonopterus argenteus*. Cuvier, 1817.  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia QUEIRODONTINOS (*Cheirodontinae*).

19. *Aphyocharax alburnus* (Günther, 1869).  
Mojarra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia ANOSTOMATINOS (*Anostomatinae*).

- ~~20. *Schizodon platys* (Garman, 1890).~~
21. *Schizodon vittatus* (Valenciennes, 1849).  
Distr.: Río de la Plata.

Subfamilia PROQUILODONTINOS (*Prochilodontinae*).

22. *Prochilodus lineatus* (Valenciennes, 1847).  
Sábalo. «Pescado». Ie. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata y aguas hasta la cuenca del Salado.

Subfamilia LEPORININOS (*Leporininae*).

23. *Leporinus obtusidens* (Valenciennes, 1847).  
Boga. Ie. Rh.  
Distr.: Paraná - Plata y aguas hasta la cuenca del Salado.

Subfamilia NANNOSTOMATINOS (*Nannostomatinae*).

24. *Characidium fasciatum fasciatum*. Reinhardt, 1866.  
Tritolo.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia PARODONTINOS (*Parodontinae*).

25. *Apareiodon affinis* (Steindachner, 1879).  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia CURIMATINOS (*Curimatinae*).

26. *Curimata gilberti gilberti* (Quoy y Gaimard, 1824).  
Sabalito. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata y aguas del nordeste hasta la cuenca del Salado.
27. *Curimata platana*. Günther, 1880.  
Sabalito plateado. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia SALMININOS (*Salmininae*).

28. *Salminus maxillosus*. Cuvier y Valenciennes, 1840.  
Dorado. Ie. Rc. Ric.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia CARACINOS (*Characinae*).

29. *Charax gibbosus*. (L., 1758).  
Dientudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

30. *Cynopotamus argenteus*. (Valenciennes, 1847).  
Dientudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
31. *Cynopotamus humeralis*. (Valenciennes, 1847).  
Dientudo. Dientudito. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
32. *Cyrtocharax squamosus*. (Eigenmann y Kennedy, 1908).  
Dientudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
33. *Roeboides bonariensis*. (Steindachner, 1879).  
Dientudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
34. *Roeboides prognathus*. (Boulenger, 1895).  
Dientudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
35. *Asiphonichthys stenopterus*. Cope, 1894.  
Dientudo.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia ACESTRORRINQUINOS. (*Acestrorhynchinae*).

36. *Acestrorhamphus hepsetus*. (Cuvier, 1829).  
Dientudo. Dentudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
37. *Acestrorhamphus jenynsi*. (Günther, 1864).  
Dientudo. Dentudo. Rc.  
Distr.: Toda la provincia hasta Ventania.
38. *Acestrorhynchus falcatus*. (Bloch, 1794).  
Dientudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia RAFIODONTINOS. (*Rhaphiodontinae*).

39. *Rhaphiodon vulpinus*. Agassiz, 1829.  
Chafalote. Machete. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia BRICONINOS. (*Bryconinae*).

40. *Brycon orbis nyamus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Pirapitá. Salmón del Paraná. Ie., Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia PIRRULININOS. (*Pyrhulinae*).

41. *Pyrhulina australis*. (Eigenmann y Kennedy, 1903).  
Mojarra.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia GASTEROPELECINOS. (*Gasteropelecinae*).

42. *Thoracocharax stellatus*. (Kner, 1859).  
Pechito.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia TRIPORTEINOS. (*Triportheinae*).

43. *Triportheus paranensis*. (Günther, 1874)  
Pirá-guirá. Golondrina. Machete.  
Distr.: Paraná - Plata.
44. *Pseudocorynopoma doriai*. Perugia, 1891.  
Buchona. Mojarra de velo.  
Distr.: Paraná - Plata y nordeste rioplatense.

Familia ERITRINIDOS. (*Erithrinidae*).

Subfamilia ERITRININOS. (*Erithrininae*).

45. *Hoplerythrinus unitaeniatus*. (Spix, 1829).  
Distr.: Paraná - Plata.
46. *Hoplias malabaricus malabaricus*. (Bloch, 1795).  
Tararira. Taralila. Tarucha. Ie., Rc., Ric.  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.

Familia SERRASALMIDOS. (*Serrasalmidae*).

Subfamilia SERRASALMINOS. (*Serrasalminae*).

47. *Serrasalmus marginatus*. Valenciennes, 1847.  
Palometa. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

48. *Serrasalmus nattereri*. (Kner., 1860).  
Palometa. Piraña. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
49. *Serrasalmus piraya*. Cuvier, 1820.  
Piraña. Palometa. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
50. *Serrasalmus spiropleura*. Kner., 1860.  
Palometa. Palometa negra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
51. *Serrasalmus ternetzi*. Steindachner, 1908.  
Palometa. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia MILEINOS. (*Myleinae*).

52. *Colossoma mitrei*. (Berg., 1895).  
Pacú. Ie., Rh.  
Distr.: Paraná - Plata.
53. *Mylossoma duriventre*. (Cuvier, 1818).  
Pacucito. Palometa. Rh.  
Distr.: Paraná - Plata.
54. *Mylossoma orbignyanus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Pacucito. Palometa. Rh.  
Distr.: Paraná - Plata.
55. *Mylossoma paraguayense*. Norman, 1929.  
Pacucito. Palometa. Rh.  
Distr.: Paraná - Plata.

Suborden GIMNOTOIDEOS. (*Gymnotoidei* o *Gymnonoti*).  
Familia RANFICTIDOS (*Rhamphichthyidae*).

56. *Rhamphichthys rostratus*. (L., 1758).  
Señorita. Bombilla. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia APTERONOTIDOS. (*Apteronotidae*).

57. *Sternarchus albifrons*. (L., 1758).  
Morena negra. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia GIMNOTIDOS. (*Gymnotidae*).

58. *Eigenmannia virescens*. (Valenciennes, 1847).  
Señorita. Bandera, Ratona. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
59. *Gymnotus carapo*. L., 1758.  
Morena pintada. Carapo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata

Orden SILURIFORMES o NEMATOGNATOS.

Familia DIPLOMISTIDOS. (*Diplomystidae*).

60. *Diplomyste viedmensis*. (Mac Donagh, 1931).  
Otuno. Bagre aterciopelado. ✓  
Distr.: Río Negro.

Familia TAQUISURIDOS. (*Tachysuridae*).

61. *Genidens genidens*. (Valenciennes, 1839).  
Bagre.  
Distr.: Río de la Plata.
62. *Netuma barba*. (Lacepede, 1803).  
Bagre.  
Distr.: Río de la Plata.

Familia AGENEIOSIDOS. (*Ageneiosidae*).

63. *Ageneiosus brevifilis*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Manduvá. Ie., Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
64. *Ageneiosus valenciennesi*. Bleeker, 1864.  
Manduví. Ie., Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia AUQUENIPTERIDOS. (*Auchenipteridae*).

65. *Auchenipterus nuchalis*. (Spix, 1829).  
Hocicón. Ie.  
Distr.: Paraná - Plata.

66. *Trachycorystes albicruz*. Berg., 1901.  
Bagre rojo. Apretador. Bagre colorado. Bagre cruz blanca.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia DORADIDOS. (*Doradidae*).

67. *Doras laevigatulus*. (Berg., 1895).  
Armado.  
Distr.: Paraná - Plata.
68. *Orydoras kneri*. Bleeker, 1863.  
Armado chancho. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.
69. *Rhinodoras d'orbignyi*. (Kröyer, 1855).  
Armado amarillo. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.
70. *Pterodoras granulosus*. (Valenciennes, 1839).  
Armado chancho. Armado común. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia PIMELODIDOS. (*Pimelodidae*).

Subfamilia PIMELODINOS. (*Pimelodinae*).

71. *Bergiaria platana*. (Steindachner, 1908).  
Bagre.  
Distr.: Paraná - Plata.
72. *Bergiaria westermanni*. (Reinhardt, 1874).  
Bagre chancho. Bagre trompudo. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
73. *Heptapterus mustelinus*. (Valenciennes, 1840).  
Bagre anguila.  
Distr.: Paraná - Plata.
74. *Iheringichthys labrosus*. (Lütken, 1874).  
Bagre trompudo.  
Distr.: Paraná - Plata.
75. *Myoglanis colletti*. (Steindachner, 1882).  
Bagre.  
Distr.: Río de la Plata.

76. *Parapimelodus valenciennesi*. (Kröyer, 1874).  
Bagarito. Bagre porteño. Porteñito. Ro., y planctófago.  
Distr.: Paraná - Plata y nordeste hasta la cuenca del Salado.
77. *Pimelodella gracilis*. (Valenciennes, 1840).  
Bagre gris. Bagre cantor. Ro.  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.
78. *Pimelodella laticeps australis*. Eigenmann, 1917.  
Bagrecito.  
Distr.: Río de la Plata.
79. *Pimelodus albicans*. (Valenciennes, 1840).  
Bagre blanco. Moncholo. Ie., Ro  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta el Salado.
80. *Pimelodus argenteus*. Perugia, 1891.  
Bagre.  
Distr.: Río de la Plata.
81. *Pimelodus brevis*. Marini, Nichols y La Monte, 1933.  
Bagrecito.  
Distr.: Paraná - Plata.
82. *Pimelodus clarias maculatus*. (Lacepede, 1803).  
Bagre amarillo. Bagre manchado. Bagre overo. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata y nordeste hasta la cuenca del Salado.
83. *Rhamdia quelen*. (Quoy y Gaimard, 1824).  
Bagre sapo.  
Distr.: Sierra de la Ventana.
84. *Rhamdia sapo*. (Valenciennes, 1840).  
Bagre sapo. Ie., Ro.  
Distr.: Toda la provincia hasta la laguna Salada Grande y proximidades de Bahía Blanca.
85. *Zungaro zungaro*. (Humboldt, 1833).  
Manguruyú. Bagre tosquero. Apretador. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia LUCIOPIMELODINOS. (*Luciopimelodinae*).

86. *Luciopimelodus pati*. (Valenciennes, 1840).  
Patí. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.

87. *Megalonema platanum*. (Günther, 1880).  
Bagre plateado. Patí bastardo. Mal anuncio. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.
88. *Perugia argentina*. Mac Donagh, 1938.  
Patí de aletas negras.  
Distr.: Paraná - Plata.



Subfamilia SORUBIMINOS. (*Sorubiminae*).

89. *Hemisorubim platyrhynchos*. (Valenciennes, 1840).  
Distr.: Río Paraná.
90. *Paulicea luetkeni*. (Steindachner, 1875).  
Manguruyú pará. Manguruyú. Jahú. Ie., Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.
91. *Pseudoplatystoma coruscans*. (Agassiz, 1829).  
Surubí. Ie., Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
92. *Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum*. (L., 1766).  
Surubí atigrado. Surubí rayado. Ie., Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
93. *Sorubim lima*. (Schneider, 1801).  
Cucharón. Cucharita. Pico de pato. Ie.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia HIPOFTALMIDOS. (*Hypophthalmidae*).

94. *Hypophthalmus oremaculatus*. Nani y Fuster, 1947.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia PIGIDIDOS. (*Pygidiidae*).

-  95. *Hatcheria pique*. Mac Donagh, 1938.  
Pique.  
Distr.: Río Colorado.
-  96. *Homodiaetus maculatus*. (Steindachner, 1879).  
«Camarón». Chupa chupa. Régimen hematófago.

Familia ASPREDINIDOS. (*Aspredinidae*).

97. *Bunocephalus coracoideus*. (Cope, 1874).  
Guitarrita.  
Distr.: Paraná - Plata.
98. *Bunocephalus doriai*. Boulenger, 1910.  
Guitarrita.  
Distr.: Río Paraná.
99. *Bunocephalus iheringi*. Boulenger, 1910.  
Guitarrita. Pez guitarra.  
Distr.: Paraná - Plata y franja nordeste de la provincia.

Familia CALICTIDOS. (*Callichthyidae*).

100. *Callichthys callichthys*. (L., 1758).  
Cascarudo.  
Distr.: Paraná - Plata.
101. *Hoplosternum littorale*. (Hancock, 1828).  
Distr.: Paraná - Plata.
102. *Corydoras aeneus*. (Gill., 1858).  
Tachuela.  
Distr.: Río de la Plata.
103. *Corydoras microcephalus*. Regan, 1912.  
Tachuela.  
Distr.: Río de la Plata.
104. *Corydoras microps*. Eigenmann y Kennedy, 1904.  
Tachuela.  
Distr.: Río de la Plata.
105. *Corydoras paleatus*. (Jenyns, 1842).  
Tachuela. Amarillito. Basurero. Barriga de fuego.  
Distr.: Paraná-Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado y Mar del Plata.

Familia LORICARIDOS. (*Loricariidae*).

Subfamilia NEOPLESCOSTOMINOS. (*Neoplecostominae*).

106. *Rhinelepis aspera*. Spix, 1829.  
Vieja. RII.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia PLE COSTOMINOS. (*Plecostominae*).

107. *Plecostomus commersoni*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Vieja. Vieja de agua. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.
108. *Plecostomus laplatae*. Eigenmann, 1907.  
Vieja. Vieja de agua. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata.
109. *Plecostomus punctatus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Vieja. Vieja de agua. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata.
110. *Plecostomus robini*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Vieja. Vieja de agua. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata.
111. *Plecostomus taeniatus*. Regan, 1908.  
Vieja. Vieja de agua. Ril.  
Distr.: Río de la Plata.
112. *Ancistrus cirrhosus*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Vieja. Ril.  
Distr.: Paraná - Plata.
113. *Ancistrus stigmaticus*. Eigenmann y Eigenmann, 1889.  
Vieja de manitos.  
Distr.: Río de la Plata.

Subfamilia HIPOPTOPOMATINOS. (*Hypoptopomatinae*).

114. *Otocinclus arnoldi*. Regan, 1910.  
Limpia vidrios (entre los acuaristas).  
Distr.: Paraná - Plata y franja nordeste de la provincia.
115. *Otocinclus flexilis*. Cope, 1872.  
Distr.: Paraná - Plata.
116. *Microlepidogaster maculipinnis*. (Regan, 1912).  
Distr.: Paraná - Plata.
117. *Microlepidogaster perforatus*. Eigenmann y Eigenmann, 1889.  
Distr.: Paraná - Plata.

Subfamilia LORICARINOS. (*Loricariinae*).

118. *Loricaria (Loricariichthys) anus*. (Cuv. y Val., 1840).  
Vieja. Vieja de agua. Ro.  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste de la provincia hasta la cuenca del Salado.
119. *Loricaria (Loricariichthys) labialis*. Boulenger, 1895.  
Vieja. Vieja de agua. Ro.  
Distr.: Paraná - Plata.
120. *Loricaria (Loricariichthys) typus*. (Bleeker, 1864).  
Vieja. Vieja de agua.  
Distr.: Paraná - Plata.
121. *Loricaria (Loricaria) laticeps*. Regan, 1904.  
Vieja. Vieja de agua.  
Distr.: Río Paraná.
122. *Loricaria (Loricaria) macrops*. Regan, 1904.  
Vieja de cola. Vieja.  
Distr.: Paraná - Plata.
123. *Loricaria (Loricaria) vetula*. Cuvier y Valenciennes, 1840.  
Vieja de cola. Vieja de látigo. Ro.  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.

Orden CIPRINODONTIFORMES o CIPRINODONTES o MICROCI-  
PRINOS (*Cyprinodontiformes* = *Cyprinodontes* = *Microcyprini*).  
Suborden CIPRINODONTOIDES o PECILIOIDES. (*Cyprinodontoi-  
dei* = *Poecilioides*).

Superfamilia CIPRINODONTOIDEOS (*Cyprinodontoideae*).

Familia CIPRINODONTIDOS (*Cyprinodontidae*).

124. *Cynolebias bellotti*. Steindachner, 1881.  
«Pavito»! (acuaristas).  
Distr.: Paraná - Plata, el nordeste, cuenca del Salado, Azul y San An-  
tonio (Juárez).
125. *Cynolebias elongatus*. Steindachner, 1881.  
Distr.: Río de la Plata.
126. *Cynolebias gibberosus*. Berg., 1897.  
Distr.: Azul.
127. *Cynolebias holmbergi*. Berg, 1897.  
Distr.: Río de la Plata y arroyo Vivoratá.

Superfamilia PECILIOIDEOS. (*Poecilioidae*).  
Familia JENYNSIDOS (*Jenynsiidae*).

128. *Jenynsia lineata*. (Jenyns, 1842).

Madre del agua. Overito.

Distr.: Toda la provincia.

Familia PECILIDOS (*Poeciliidae*).

 129. *Cnesterodon decenmaculatus*. (Jenyns, 1842).

Pechito. Madrecita del agua.

Distr.: Norte y nordeste de la provincia hasta la zona interserrana.

130. *Phalloceros caudimaculatus*. (Hensel, 1868).

Distr.: Paraná - Plata.

 131. *Phalloptychus januarius*. (Hensel, 1868).

Distr.: ?

Orden MUGILIFORMES o PERCESOCES (*Mugiliformes*).

Suborden MUGILOIDEOS (*Mugiloidei*).


Familia MUGILIDOS (*Mugilidae*).

132. *Mugil platanus*. Günther, 1880.

Lisa. Ie., Ril.

Distr.: Paraná - Plata, aguas del nordeste hasta la cuenca del Salado, y tramo inferior de ríos de pendiente atlántica hasta Bahía Blanca (?).

Familia ATERINIDOS (*Atherinidae*).

 133. *Basilichthys bonariensis*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).

Pejerrey. Ie., Ro. especialmente planctófago.

Distr.: Toda la provincia.

134. *Basilichthys perugiai*. (Evermann y Kendall, 1907).

Juncalero. Ie.

Distr.: Paraná - Plata.

Orden SYMBRANQUIFORMES (*Symbranchiformes* = *Symbranchii*).

Suborden SIMBRANCOIDEOS (*Symbranchoidei*).

Familia SIMBRANQUIDOS (*Symbranchidae*).

135. *Symbranchus marmoratus*. B'och, 1795.

«Anguila». Anguila criolla. Ie.

Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.

Orden PERCIFORMES o ACANTOPTERIGIOS o PERCOMORFOS  
(*Perciformes* = *Acanthopterygii* = *Percomorphi*).  
Suborden PERCOIDEOS (*Percoidei*).  
Superfamilia PERCOIDES (*Percoidae*).  
Familia PERCICTIDOS (*Percichthyidae*).

136. *Percichthys altispinnis*. Regan, 1905.  
Perca espinuda.  
Distr.: Río Colorado.
137. *Percichthys trucha*. (Cuvier y Valenciennes, 1840).  
Perca o trucha criolla. Ie., Rc.  
Distr.: Ríos Colorado y Negro.

Familia ESQUIENIDOS (*Sciaenidae*).

138. *Pachyurus bonariensis*. Steindachner, 1879.  
Corvina de río. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
139. *Plagioscion macdonaghi*. Daneri, 1955.  
Corvina de río. Rc.  
Distr.: Paraná - Plata.
140. *Plagioscion auratus*. (Castelnau, 1855).  
Corvina de río.  
Distr.: Paraná - Plata.

Familia CICLIDOS (*Cichlidae*).

141. *Aequidens vittatus*. (Heckel, 1840).  
Distr.: Paraná - Plata y franja rioplatense.
142. *Cichlasoma autochthon*. (Günther, 1862).  
Chanchita.  
Distr.: Paraná - Plata.
143. *Cichlasoma facetum*. (Jenyns, 1842).  
Chanchita. «Palometa». Castañeta. Peine.  
Distr.: Paraná - Plata, norte y nordeste, cuenca del Salado, hasta la zona de Tandilia.
144. *Cichlasoma festivum*. (Heckel, 1840).  
Chanchita  
Distr.: Río de la Plata.

145. *Apistogramma pleurotaenia*. Regan, 1909.  
Distr.: Río de la Plata.
146. *Geophagus australis*. Eigenmann, 1907.  
Chanchita.  
Distr.: Río de la Plata.
147. *Geophagus brachyurus*. Cope, 1894.  
San Pedro.  
Distr.: Río de la Plata.
148. *Geophagus brasiliensis*. (Quoy y Gaimard, 1824).  
San Pedro.  
Distr.: Paraná - Plata y franja ríoplatense.
149. *Crenicichla lacustris*. (Castelnau, 1855).  
Cabeza amarga.  
Distr.: Paraná - Plata y el nordeste hasta la cuenca del Salado.
150. *Crenicichla lepidota*. (Heckel, 1840).  
Distr.: Paraná - Plata.
151. *Crenicichla saxatilis*. (L., 1758).  
Cabeza amarga. Juanita.  
Distr.: Paraná - Plata y franja ríoplatense.
152. *Crenicichla semifasciata*. (Heckel, 1840).  
Distr.: Paraná - Plata.

Orden PLEURONECTIFORMES o HETEROSOMADOS (*Pleuro-  
nectiformes* = *Heterosomata*).

Suborden PLEURONECTOIDEOS (*Pleuronectoidei*).

Familia AQUIRIDOS (*Achiridae*).

153. *Achirus jenynsi*. (Günther, 1862).  
Lenguado de río.  
Distr.: Río de la Plata.
154. *Achirus lineatus*. (L., 1758).  
Lenguado de río.  
Distr.: Paraná - Plata.
155. *Achirus trichospilus*. Berg., 1895.  
Lenguado de río.  
Distr.: Río de la Plata.

ESPECIES EXOTICAS NATURALIZADAS.

Familia CIPRINIDOS (*Cyprinidae*).

156. *Cyprinus carpio*. (L., 1758).  
Carpa. Ro. Considerada plaga.

Familia SALMONIDOS (*Salmonidae*).

157. *Salmo irideus*. Gibbons, 1855.  
Trucha arco iris.  
Distr.: Arroyos de la Sierra de la Ventana.

---

Clase BATRACIOS o ANFIBIOS (*Batrachia*).

Orden APODOS o GIMNOFIONES (*Apoda* o *Gymnophiona*).

Familia CECILIDOS (*Caeciliidae*).

1. *Chthonerpeton indistinctum*. (Reinhardt y Lütken, 1862).  
Tapalcuá.  
Distr.: Dominio subtropical. Costa rioplatense: Tigre, Núñez, Río Santiago, Palo Blanco.

Orden ANUROS o SALIENCIA (*Anura* o *Salientia*).

Familia BUFONIDOS (*Bufonidae*).

2. *Bufo arenarum*. Hensel, 1867.  
Sapo. Sapo común.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico, hasta aproximadamente el Río Colorado.
3. *Bufo granulosus d'orbigny*. Duméril y Bibron, 1841.  
Sapito panza amarilla.  
Distr.: Dominio subtropical y pampásico hasta General Lavalle.

Familia HILIDOS (*Hylidae*).

4. *Hyla catharinae*. Boulenger, 1888.  
Ranita de zarzal.  
Distr.: Dominio subtropical (San Martín).

5. *Hyla guentheri*. Boulenger, 1886.  
Ranita de zarzal.  
Distr.: Dominio subtropical.
6. *Hyla raddiana raddiana*. Fitzinger, 1826.  
Ranita de zarzal.  
Distr.: Toda la provincia.
7. *Hyla siemersi*. Mertens, 1937.  
Ranita de zarzal.  
Distr.: Dominio subtropical (Delta).
8. *Hyla evelinae*. Schmidt, 1914.  
Ranita de zarzal.  
Distr.: Delta.

Familia LEPTODACTILIDOS (*Leptodactylidae*).

9. *Pseudis paradoxus*. (L., 1754).  
Distr.: Dominio subtropical y nordeste del pampásico.
10. *Leptodactylus podicipinus*. (Cope, 1862).  
Rana.  
Distr.: Dominio subtropical.
11. *Leptodactylus ocellatus ocellatus*. (L., 1758).  
Rana. Rana común. Rana criolla.  
Distr.: Dominios subtropical y nordeste del pampásico.
12. *Leptodactylus ocellatus bonariensis*. Cei., 1949.  
Rana. Rana criolla. Rana común.  
Distr.: Centro y sur del dominio pampásico, dominio central hasta el Río Colorado.
13. *Leptodactylus prognathus*. Boulenger, 1888.  
Rana.  
Distr.: Dominio subtropical.
14. *Leptodactylus mystacinus*. (Burmeister, 1861).  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
15. *Pseudopaludicola falcipes*. (Hensel, 1867).  
Distr.: Dominio subtropical.
16. *Physalaemus barbouri*. Parker, 1927.  
Distr.: Dominio subtropical y pampásico.
17. *Physalaemus biligonigerus*. (Cope, 1860).  
Distr.: Dominio subtropical (Buenos Aires).

18. *Physalaemus fernandezae*. (Müller, 1926).  
Distr.: Dominio pampásico. (Cristiano Muerto entre partidos de Necochea y Tres Arroyos). Probablemente igual a *Pseudopaludicola falcipes*.
19. *Physalaemus fuscomaculatus*. (Steindachner, 1864).  
Distr.: Dominio subtropical.
20. *Physalaemus gracilis*. (Boulenger, 1863).  
Distr.: ?

Familia CERATOPFRIDOS (*Ceratophryidae*).

21. *Ceratophrys ornata*. (Bell, 1843).  
Escuerzo.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
22. *Odontophrynus americanus*. (Duméril y Bibron, 1841).  
Escuerzo chico.  
Distr.: Toda la provincia.

Familia BRAQUICEFALIDOS (*Brachicephalidae*).

23. *Dendrophryniscus stelzneri*. (Weyenbergh, 1876).  
Sapito enano.  
Distr.: Dominio subtropical; sierras del dominio pampásico hasta Ventania.

Familia MICROHILIDOS (*Microhylidae*).

24. *Elachistocleis ovalis bicolor*. (Guérin, 1838).  
Distr.: Dominio subtropical.



Clase REPTILES (*Reptilia*).

Orden TESTUDINADOS o QUELONIOS (*Testudinata* o *Chelonia*).

Familia DERMOQUELIDIDOS (*Dermochelydidae*).

1. *Dermochelys coriacea*. (L., 1766).  
Laúd. Tortuga laúd.  
Distr.: Costa atlántica (hallazgos en Mar del Plata, Punta Médanos, entre Médanos y San Antonio).

Familia TESTUDINIDOS (*Testudinidae*).

2. *Chrysemys d'orbigny*. (Duméril y Bibron, 1835).  
Tortuga de río.  
Distr.: Dominio subtropical.
3. *Testudo chilensis*. Gray, 1870.  
Tortuga de tierra.  
Distr.: Toda la provincia.

Familia QUELONIDOS (*Chelonidae*).

4. *Chelonia mydas*. (L., 1766).  
Tortuga de mar. Tortuga franca.  
Distr.: Costa atlántica (hallazgos en Mar del Plata y Necochea).
5. *Caretta caretta*. (L., 1766).  
Tortuga de mar. Tortuga comestible.  
Distr.: Costa atlántica, penetrando ocasionalmente en el estuario del Plata.

Familia QUELIDOS (*Chaelidae*).

6. *Hydromedusa tectifera*. (Cope, 1869).  
Tortuga de río.  
Distr.: Dominio subtropical.
7. *Phrynops hilari*. Duméril y Bibron, 1835.  
Tortuga de arroyo.  
Distr.: Dominio subtropical.

Orden ESCAMADÓS (*Squamata*).

Suborden SAURIOS (*Sauria*).

Familia GECONIDOS (*Geckonidae*).

8. *Homonota darwini*. Boulenger, 1885.  
Lagartija.  
Distr.: Dominios central y pampásico, mayormente en las áreas serranas, (Sierra de la Ventana, Tandil, Balcarce).

Familia IGUANIDOS (*Iguanidae*).

9. *Aptycholaemus longicauda*. Boulenger, 1891.  
Distr.: ?
10. *Anisolepis undulatus*. (Wiegmann, 1834).  
Distr.: Dominio subtropical (Punta Lara, La Plata).

11. *Urostrophus scapulatus*. (Burmeister, 1861).  
Distr.: Dominio central (Sierra de la Ventana).
12. *Liolaemus darwini*. (Bell, 1843).  
Lagartija.  
Distr.: Dominios central y patagónico (Bahía Blanca).
13. *Liolaemus multimaculatus*. (Duméril y Bibron, 1837).  
Lagartija.  
Distr.: Dominio pampásico, en el cordón de médanos litorales de Bahía Blanca a Mar Chiquita.
14. *Liolaemus wiegmanni*. (Duméril y Bibron, 1837).  
Lagartija.  
Distr.: Dominios pampásico y central (Bahía Blanca).
15. *Proctotretus pectinatus*. Duméril y Bibron, 1837.  
Lagartija.  
Distr.: Dominio pampásico (Sierras Bayas, Mar del Plata, Necochea).

Familia ESCINDIDOS (*Scindidae*).

16. *Mayuba dorsivittata*. (Cope, 1862).  
Anberé. Tedyú-chi.  
Distr.: Dominio pampásico (Mar del Plata).

Familia TEIIDOS (*Teiidae*).

17. *Tupinambis rufescens*. (Günther, 1871).  
Lagarto colorado. «Iguana» colorada.  
Distr.: Probablemente dominio central.
18. *Tupinambis teguixin*. (L., 1758).  
«Iguana». «Iguana overa». Lagarto overo. Teyú-guazú.  
Distr.: Toda la provincia (Los Talas, Sierras Bayas, Sierra de la Ventana, etcétera).
19. *Pantodactylus schreibersi schreibersi*. (Wiegmann, 1834).  
Lagartija negra.  
Distr.: Dominio subtropical (alrededores de Buenos Aires).
20. *Ameiva longicauda*. (Bell, 1857).  
Lagartija.  
Distr.: Dominio central (Sierras de la Ventana, Pillahuincó, B. Blanca).

21. *Teius teyou teyou*. (Daudin, 1803).  
Lagarto verde. Teyú-f. Teyú-hoby.  
Distr.: Toda la provincia.

Familia ANFISBENIDOS (*Amphisbaenidae*).

22. *Amphisbaena angustifrons*. Cope, 1861.  
Víbora de dos cabezas.  
Distr.: Buenos Aires.
23. *Amphisbaena vermicularis darwini*. (Duméril y Bibron, 1839).  
Víbora de dos cabezas. Madre de las hormigas.  
Distr.: Dominio subtropical y pampásico hasta Sierra de la Ventana.
24. *Anopsibaena kingi*. (Bell, 1833).  
Distr.: Dominio pampásico.

Familia ANGUIDOS (*Anguidae*).

25. *Ophiodes striatus*. (Spix, 1825).  
Víbora de cristal. Mboi-pepé.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico (Sierras Bayas).

Suborden OFIDIOS (*Ophidia*).

Familia LEPTOTIFLOPIDOS (*Leptotyphlopidae*).

26. *Leptotyphlops albifrons*. (Wagler, 1824).  
Distr.: Dominio pampásico hasta Tandilia.

Familia COLUBRIDOS (*Colubridae*).

Subfamilia COLUBRINOS (*Colubrinae*).

27. *Helicops carinicauda*. (Wied., 1825).  
Culebra acuática.  
Distr.: Dominio subtropical.
28. *Helicops leopardina*. (Schlegel, 1837).  
Culebra acuática.  
Distr.: Dominio subtropical.
29. *Chironius carinatus*. (L., 1758).  
Parapintos.  
Distr.: Dominio subtropical hasta Los Talas.

30. *Leimadophis almaña*. (Wagler, 1824).  
Nandurié.  
Distr.: Dominio subtropical.
31. *Leimadophis poecilogyrus platensis*. Amaral, 1946.  
Nandurié.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
32. *Liophis anomalus*. (Günther, 1858).  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
33. *Liophis miliaris semiaureus*. (Cope, 1862).  
Distr.: Dominio subtropical.
34. *Lystrophis d'orbigny*. (Duméril y Bibron, 1854).  
Culebra ñata. Falsa yararará. Víbora ñata.  
Distr.: Dominio subtropical y pampásico, hasta Bahía Blanca.
35. *Lystrophis semicinctus*. (Duméril y Bibron, 1854).  
Falsa coral.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia DISPSADOMORFINOS (*Dispsadomorphinae*).

36. *Pseudoboa rhombifera*. (Duméril y Bibron, 1854).  
Culebra. Falsa coral.  
Distr. Toda la provincia.
37. *Pseudoboa rustica*. (Cope, 1877).  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
38. *Tomodon ocellatus ocellatus*. (Duméril y Bibron, 1854).  
Falsa yararará. Mboi-pé-mi.  
Distr.: Dominio pampásico.
39. *Chlorosoma aestivum*. (Duméril y Bibron, 1854).  
Mboi-hovich.  
Distr.: Dominio subtropical.
40. *Chlorosoma psammophideum*. (Günther, 1872).  
Distr.: Dominios pampásico y central.
41. *Chlorosoma schotti*. (Schlegel, 1837).  
Mbói-hovich.  
Distr.: Dominios subtropical, pampásico y central.

42. *Elapomorphus biliniatus*. Duméril y Bibron, 1854.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.

Familia ELAPIDOS (*Elapidae*).

43. *Micrurus lemniscatus frontalis*. (Duméril y Bibron, 1854).  
Víbora de coral. Mbói-chumbé-guazú. Considerada dañina.  
Distr.: Dominios subtropical, noroeste del pampásico y central.

Familia CROTALIDOS (*Crotalidae*).

Subfamilia LAQUESINOS (*Lachesinae*).

44. *Bothrops alternata*. Duméril y Bibron, 1854.  
Yarará. Víbora de la cruz. Considerada dañina.  
Distr.: Parte noroeste del dominio pampásico.

45. *Bothrops ammodytoides*. Leybold, 1873.  
Yarará ñata.  
Distr.: Dominios central y patagónico.

46. *Bothrops newwiedi meridionalis*. Amaral, 1930.  
Yarará chica.  
Distr.: Dominio central.

Subfamilia CROTALINOS (*Crotalinae*).

47. *Crotalus terrificus terrificus*. (Laurentius, 1768).  
Víbora de cascabel. Crótalo.  
Distr.: Parte norte y noroeste del dominio pampásico.

Orden LORICADOS (*Loricata*).

Familia CROCODILIDOS (*Crocodylidae*).

48. *Caiman latirostris*. (Daudin, 1802).  
Yacaré. Caimán.  
Distr.: Dominio subtropical. Llega ocasionalmente al Delta del Paraná,  
y hasta la costa rioplatense en ocasión de crecientes. Hallóse un ejemplar  
joven en Río Santiago.

## Clase AVES

Dadas las particularidades corológicas de esta clase, para indicar la distribución geográfica de las especies bonaerenses, hacemos referencia a 4 zonas o áreas: 1, 2, 3 y 4, que figuran en el mapa Nº 2. La zona 1 posee una ornitofauna predominantemente de tipo subtropical, la 2 tiene aves de distribución «central», la 4, aves patagónicas en su mayor parte, y el área 3 es una intermedia o de transición con desborde de las faunas de las demás zonas circundantes.

### Orden RHEIFORMES (*Rheiformes*).

#### Familia RHEIDOS (*Rheidae*).

1. *Rhea americana albescens*. L. Arribáizaga y Holmberg, 1878.  
Ñandú. Impropiamente avestruz.  
Distr.: Areas 2, 3, 4.

### Orden TINAMIFORMES (*Tinamiformes*).

#### Familia TINAMIDOS (*Tinamidae*).

2. *Nothura darwini darwini*. Gray, 1867.  
Perdiz chica de Patagonia.  
Distr.: Area 4 (Bahía Blanca).
3. *Nothura maculosa nigroguttata*. Salvadori, 1895.  
Perdiz. Perdiz chica.  
Distr.: Toda la Provincia.
4. *Rhynchotus rufescens pallescens*. Kothe, 1907.  
Perdiz colorada, «Martineta» colorada.  
Distr.: Toda la provincia.
5. *Eudromia elegans elegans*. d'Orbigny y Geoffroy, 1832.  
Copetona. Martineta. Martineta copetona.  
Distr.: Areas 2, 3, 4.

### Orden ESFENICIFORMES (*Spheniciformes*).

#### Familia ESPENISCIDOS (*Spheniscidae*).

6. *Eudyptes crestatus crestatus*. (J. F. Miller, 1784).  
Pingüín de penacho amarillo.  
Distr.: Ocasional en toda la costa atlántica y Río de la Plata.

7. *Spheniscus magellanicus*. (J. R. Forster, 1781).  
Pingüín. Pingüino. Pájaro niño, Pájaro bobo.  
Distr.: Costa atlántica y Río de la Plata.

Orden PODICIPEDIFORMES (*Podicipediformes*).

Familia PODICIPEDIDOS (*Podicipedidae*).

8. *Podiceps rolland chilensis*. (Lesson, 1828).  
Macacito.  
Distr.: Toda la provincia.
9. *Podiceps occipitalis occipitalis*. (Garnot, 1826).  
Macá plateado. Macá blanco.  
Distr.: Posiblemente toda la provincia.
10. *Podiceps dominicus speciosus*. (Lynch Arribáizaga, 1877).  
Macá. Macá mediano.  
Distr.: Area 1.
11. *Aechmophorus major*. (Boddaert, 1783).  
Macá grande. Zambullidor.  
Distr.: Toda la provincia.

Orden PROCELARIFORMES (*Procellariiformes*).

Familia DIOMEDEIDOS (*Diomedeidae*).

12. *Diomedea cauta salvini*. (Rotschild, 1893).  
Albatros.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
13. *Diomedea chlororhynchos*. Gmelin, 1789.  
Albatros de pico amarillo y negro.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
14. *Diomedea epomophora longirostris*. Mathews, 1934.  
Albatros real.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
15. *Diomedea exulans exulans*. L., 1758.  
Albatros.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
16. *Diomedea melanophris melanophris*. (Temminck, 1828).  
Albatros de cejas negras.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Familia PROCELARIDOS (*Procellariidae*).  
Subfamilia FULMARINOS (*Fulmarinae*).

17. *Macronectes giganteus*. (Gmelin, 1789).  
Quebrantahuesos. Petrel gigante.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
18. *Daption capensis*. (L., 1758).  
Petrel común. Damero del Cabo. Carnero del Cabo.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
19. *Priocella antarctica*. (Stephens, 1826).  
Petrel gris plateado.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Subfamilia BULWERINOS (*Bulweriinae*).

20. *Pterodroma incerta*. (Schlegel, 1863).  
Petrel grande.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Subfamilia PAQUIPTILINOS (*Pachyptilinae*).

21. *Halobaena caerulea*. (Gmelin, 1789).  
Petrel azulado.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
22. *Pachyptila belcheri solanderi*. (Mathews, 1912).  
Petrel  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Subfamilia PROCELARINOS (*Procellariinae*).

23. *Procellaria aequinoctialis aequinoctialis*. L., 1758.  
Petrel negro de barba blanca.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
24. *Adamastor cinerea*. (Gmelin, 1789).  
Petrel gris.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
25. *Puffinus gravis*. (O'Reilly, 1818).  
Petrel pardo y blanco.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

26. *Puffinus griseus*. (Gmelin, 1789).  
Petrel oscuro de pico largo.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.
27. *Puffinus puffinus puffinus*. (Brünnich, 1764).  
Petrel del Atlántico Norte.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Familia TALASIDROMIDOS (*Thalassidromidae*).  
Subfamilia OCEANITINOS (*Oceanitinae*).

28. *Oceanites oceanicus oceanicus*. (Kuhl, 1820).  
Petrel de las tormentas. Petrel de Wilson.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica y Río de la Plata.
29. *Pelagodroma marina marina*. (Latham, 1790).  
Petrel de las tormentas de cara blanca.  
Distr.: Accidental en la costa atlántica.

Familia PELECANOIDEIDOS (*Pelecanoideidae*).

30. *Pelecanoides urinatrix berardi*. (Gaimard, 1823).  
Petrel zambullidor de Las Malvinas.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica.

Orden PELECANIFORMES (*Pelecaniformes*).  
Familia PELECANIDOS (*Pelecanidae*).

31. *Phalacrocorax brasilianus brasilianus*. (Gmelin, 1789).  
Mbiguá. Biguá. Viguá. Considerada dañina.  
Distr.: Toda la provincia.
32. *Phalacrocorax albiventer*. (Lesson, 1831).  
Biguá de vientre blanco. Biguá blanco.  
Distr.: Ocasional en la vecindad del Río de la Plata.

Orden CICONIFORMES (*Ciconiiformes*).  
Familia ARDEIDOS (*Ardeidae*).  
Subfamilia ARDEINOS (*Ardeinae*).

33. *Ardea cocoi*. L., 1766.  
Garza mora.  
Distr.: Toda la provincia.

34. *Butorides striatus striatus*. (L., 1758).  
Garcita azulada. Garcita.  
Distr.: Area 1.
35. *Casmerodius albus egretta*. (Gmelin, 1789).  
Garza blanca. Garza blanca grande.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.
36. *Leucophox thula thula*. (Molina, 1782).  
Mirasol.  
Distr.: Areas 1, 3.
37. *Syrigma sibilatrix*. (Temminck, 1824).  
Chiflón.  
Distr.: Area 1.
38. *Nycticorax nycticorax tayazu-guira*. (Vieillot, 1817).  
Zorro de agua. Bruja. Cuaco. Dormilón.  
Distr.: Toda la provincia.
39. *Tigrisoma lineatum marmoratum*. (Vieillot, 1817).  
Garza colorada. Hocó.  
Distr.: Area 1.

Subfamilia BOTAURINOS (*Botaurinae*).

40. *Ixobrychus involucris*. (Vieillot, 1823).  
Mirasol. Garcita mirasol.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
41. *Botaurus pinnatus*. (Wagler, 1829).  
Hocó. Bramador.  
Distr.: Area 1.

Familia CICONIDOS (*Ciconiidae*).

Subfamilia MICTERINOS (*Mycterinae*).

42. *Mycteria americana*. L., 1758.  
Tuyuyú. Cigüeña de cabeza pelada.  
Distr.: Area 1.

Subfamilia CICONINOS (*Ciconiinae*).

43. *Euxenura maguari*. (Gmelin, 1789).  
Cigüeña. Tuyango.  
Distr.: Toda la provincia.

44. *Jabiru mycteria*. (Lichtenstein, 1819).  
Jabirú. Tuyuyú coral.  
Distr.: Areas 1' y 3.

Familia TRESQUIORNITIDOS (*Threskiornithidae*).  
Subfamilia TRESQUIORNITINOS (*Threskiornithinae*).

45. *Harpiprion caerulescens*. (Vieillot, 1817).  
Bandurria mora.  
Distr.: Ocasional en área 1. Migratoria.
46. *Theristicus caudatus caudatus*. (Boddaert, 1783).  
Bandurria de verano. Bandurria.  
Distr.: Area 1. Migratoria.
47. *Theristicus caudatus melanopis*. (Gmelin, 1789).  
Bandurria de invierno. Bandurria.  
Distr.: Toda la provincia. Migratoria.
48. *Phimosus infuscatus infuscatus*. (Lichtenstein, 1823).  
Cuervillo de cara pelada.  
Distr.: Area 1.
49. *Plegadis falcinellus guarana*. (L., 1766).  
Cuervillo de cañada. Cuervo de cañada. Bandurria.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia PLATALEINOS (*Plataleinae*).

50. *Ajaia ajaja*. (L., 1758).  
Espátula rosada. Espátula.  
Distr.: Toda la provincia.

Orden FENICOPTERIFORMES (*Phoenicopteriformes*).  
Familia FENICOPTERIDOS (*Phoenicopteridae*).

51. *Phoenicopus ruber chilensis*. Molina, 1782.  
Flamenco.  
Distr.: Toda la provincia.

Orden ANIMIFORMES (*Anhimiformes* = *Palamedeiformes*).  
Familia ANIMIDOS (*Anhimidae*).

52. *Chauna torquata*. (Oken, 1816).  
Chajá.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Orden ANSERIFORMES (*Anseriformes*).

Familia ANATIDOS (*Anatidae*).

Subfamilia CIGNINOS (*Cygninae*).

53. *Cygnus melancoriphus*. (Molina, 1782).

Cisne de cuello negro.

Distr.: Toda la provincia.

54. *Coscoroba coscoroba*. (Molina, 1782).

Ganso blanco. Cisne. Cisne blanco.

Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ANSERINOS (*Anserinae*).

55. *Chloëphaga picta picta*. (Gmelin, 1789).

Cauquén. Caikén. Avutarda. Considerada plaga.

Distr.: Areas 2, 3, 4. Migratoria.

56. *Chloëphaga picta dispar*. (Philippi y Landbeck, 1862).

Cauquén. Caikén. Avutarda. Considerada plaga.

Distr.: Areas 2, 3, 4. Migratoria.

57. *Chloëphaga poliocephala*. Scater, 1857.

Avutarda de cabeza gris. Considerada dañina.

Distr.: Areas 2, 3, 4. Migratoria.

58. *Chloëphaga rubidiceps*. Scater, 1860.

Avutarda colorada. Considerada dañina.

Distr.: Areas 3, 4. Migratoria.

Subfamilia DENDROCIGNINOS (*Dendrocygninae*).

59. *Dendrocygna viduata*. (L., 1766).

Pato viuda. Sirirí pampa.

Distr.: Areas 1, 2.

60. *Dendrocygna bicolor bicolor*. (Vieillot, 1816).

Pato silbón común. Sirirí.

Distr.: Areas 1, 2, 3.

Subfamilia ANATINOS (*Anatinae*).

61. *Cairina moschata*. (L., 1758).

Pata criollo.

Distr.: Area 1.

62. *Sarkidiornis sylvicola*. H. y R. Ihering, 1907.  
Pato crestudo.  
Distr.: Ocasional en área 1.
63. *Nettion brasiliense*. (Gmelin, 1789).  
Pato portugués.  
Distr.: Area 1.
64. *Nettion flavirostre flavirostre*. (Vieillot, 1816).  
Pato barcino chico. Pato franciscano.  
Distr.: Toda la provincia.
65. *Nettion leucophrys*. (Vieillot, 1816).  
Pato de collar. Patito de ceja blanca.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
66. *Querquedula cyanoptera cyanoptera*. (Vieillot, 1816).  
Pato colorado.  
Distr.: Toda la provincia.
67. *Querquedula versicolor versicolor*. Vieillot, 1816.  
Pato argentino.  
Distr.: Toda la provincia.
68. *Dafila bahamensis rubrirostris*. (Vieillot, 1816).  
Pato gargantilla. Pato de cara blanca.  
Distr.: Toda la provincia.
69. *Dafila spinicauda*. (Vieillot, 1816).  
Pato malcero. Pato barcino grande.  
Distr.: Toda la provincia.
70. *Mareca sibilatrix*. (Poeppig, 1829).  
Pato overo. Pato picazo.  
Distr.: Toda la provincia.
71. *Spatula platalea*. (Vieillot, 1816).  
Pato cuchara. Pato pico cuchara.  
Distr.: Toda la provincia.
72. *Heteronetta atricapilla*. (Merrem, 1841).  
Pato cabeza negra. Pato negro.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Subfamilia NIROCINOS (*Nyrocininae*).

73. *Metopiana peposaca*. (Vieillot, 1816).  
Pato picazo. Pato crestón.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ERISMATURINOS (*Erismaturinae*).

74. *Nomonyx dominicus*. (L., 1766).

Pato fierro. Pato dominico.

Distr.: Area 1.

75. *Oxyura vittata*. (Philippi, 1860).

Pato zambullidor común.

Distr.: Toda la provincia.

Orden FALCONIFORMES (*Falconiformes*).

Familia CATARTIDOS (*Cathartidae*).

76. *Coragyps atratus*. (Bechstein, 1793).

Jote. Cuervo negro.

Distr.: Areas 2, 4, ocasional en 1.

77. *Cathartes aura jota*. (Molina, 1782).

Jote.

Distr.: Area 1 (Monte Veloz), 4 (Bahía Blanca).

Familia ACCIPITRIDOS (*Accipitridae*).

Subfamilia ELANINOS (*Elaninae*).

78. *Elanus leucurus leucurus*. (Vieillot, 1818).

Halcón blanco.

Distr.: Areas 1, 3.

Subfamilia PERNINOS (*Perninae*).

79. *Elanoides forficatus yetapa*. (Vieillot, 1818).

Halcón cola tijera. Halcón tijereta.

Distr.: Ocasional área 1.

Subfamilia MILVINOS (*Milvinae*).

80. *Ictinia plumbea*. (Gmelin, 1788).

Halcón azulado.

Distr.: Accidental (General Lavalle).

81. *Rosthramus sociabilis sociabilis*. (Vieillot, 1817).

Halcón caracolero. Caracolero.

Distr.: Areas 1 y 3.

Subfamilia ACCIPITRINOS (*Accipitrinae*).

82. *Heterospizias meridionalis*. (Latham, 1790).  
Aguila colorada.  
Distr.: Area 1 (Hudson).

Subfamilia BUTEONINOS (*Buteoninae*).

83. *Buteo albicaudatus albicaudatus*. Vieillot, 1816.  
Aguila de cola blanca.  
Distr.: Areas 1, 3.
84. *Buteo fuscescens fuscescens*. (Vieillot, 1819).  
Aguila blanca. Aguila cabeza blanca.  
Distr.: Area 1 y 3.
85. *Buteo fuscescens australis*. (Swann, 1922).  
Aguila blanca.  
Distr.: Areas 2 y 4 (Guaminí, Bahía Blanca).
86. *Buteo magnirostris pucherani*. (J. y E. Verreaux, 1855).  
Gavilán de garganta negra.  
Distr.: Areas 1 y 3.
87. *Buteo polyosoma polyosoma*. (Quoy y Gaimard, 1824).  
Aguila gris.  
Distr.: Toda la provincia.
88. *Buteo swainsoni*. Bonaparte, 1838.  
Aguila langostera.  
Distr.: Area 1.
89. *Parabuteo unicinctus unicinctus*. (Temminck, 1824).  
Gavilán mixto común. Gavilán oscuro y canela.  
Distr.: Area 1 y 3.
90. *Urubitinga urubitinga urubitinga*. (Gmelin, 1788).  
Aguila negra. Aguila pescadora.  
Distr.: Accidental en área 1 (Plátanos).
91. *Harpyhaliaetus coronatus coronatus*. (Vieillot, 1817).  
Aguila coronada. Aguila de la flecha.  
Distr.: Area 4 (Carmen de Patagones).

Subfamilia CIRCINOS (*Circinae*).

92. *Circus cyaneus cinereus*. Vieillot, 1816.  
Gavilán ceniciento. Ladrón de pollos.  
Distr.: Toda la provincia.

93. *Circus brasiliensis*. (Gmelin, 1788).  
Gavilán de alas largas.  
Distr.: Area 1 y 3.
94. *Geranospiza caerulescens flexipes*. Peters, 1935.  
Gavilán aplomado. Gavilán plumizo.  
Distri.: Posiblemente área 1 (sin localidad especificada).

Familia FALCONIDOS (*Falconidae*).

Subfamilia HERPETOTERINOS (*Herpetotherinae*).

95. *Micrastur semitorquatus semitorquatus*. (Vieillot, 1817).  
Gavilán semiacollarado.  
Distr.: Area 1 (San Fernando, Capital Federal).

Subfamilia CARACARINOS (*Caracarinae* = *Polyborinae*).

96. *Milvago chimango chimango*. (Vieillot, 1816).  
Chimango.  
Distr.: Toda la provincia.
97. *Milvago chimachima chimachina*. (Vieillot, 1816).  
Chimachima.  
Distr.: Area 1.
98. *Caracara plancus plancus*. (J. F. Miller, 1777).  
Carancho. Caracara.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia POLIHIERACINOS (*Polihieracinae*).

99. *Spizapteryx circumcinctus*. (Kaup, 1851).  
Halconcito. Halconcito gris.  
Distr.: Area 2 posiblemente (sin localidad especificada).

Subfamilia FALCONINOS (*Falconinae*).

100. *Falco fuscocaerulescens fuscocaerulescens*. Vieillot, 1817.  
Halcón azulado.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.
101. *Falco peregrinus anatum*. Bonaparte, 1838.  
Halcón peregrino. Halcón peregrino del norte. Halcón viajero.  
Distr.: Areas 1 y 3.

102. *Falco peregrinus cassini*. Sharpe, 1873.  
Halcón viajero del sur.  
Distr.: Areas 1 (La Plata) y 3 (Tandil).
103. *Falco sparverius cinnamomimus*. Swainson, 1837.  
Halconcito colorado. Halconcito. Halcón canela.  
Distr.: Toda la provincia.

Orden GRUIFORMES (*Gruiformes*).  
Familia ARAMIDOS (*Aramidae*).

104. *Aramus scolopaceus carau*. Vieillot, 1817.  
Carau. Viuda loca.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia RALLIDOS (*Rallidae*).  
Subfamilia RALLINOS (*Rallinae*).

105. *Rallus limicola antarcticus*. King, 1828.  
Gallineta de pico rojo. Gallineta antártica.  
Distr.: Toda la provincia.
106. *Rallus nigricans nigricans*. (Vieillot, 1819).  
Cochapolla. Polla de agua.  
Distr.: Accidental área 1 (Baradero).
107. *Rallus rytirhynchus rytirhynchus*. (Vieillot, 1819).  
Gallineta. Gallineta de pico largo.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
108. *Pardirallus maculatus maculatus*. (Boddaert, 1783).  
Gallineta overa. Polla de agua.  
Distr.: Area 1.
109. *Aramides cajanea cajanea*. (P. L. S. Müller, 1776).  
Chiricote. Gallineta rojiza.  
Distr.: Area 1 (Isla Martín García, Punta Lara).
110. *Aramides ypecaha*. (Vieillot, 1819).  
Ypecahá. Gallineta de agua.  
Distr.: Area 1, 3.
111. *Porzana spiloptera*. Durnford, 1877.  
Gallineta de los alfalfares. Gallineta enana.  
Distr.: Areas 1 y 3 (Zelaya, Avellaneda, Pradere, Cabo San Antonio).
112. *Porzana flaviventer flaviventer*. (Boddaert, 1783).  
Gallineta enana de vientre amarillo.  
Distr.: Areas 1 y 3 (Tigre y Mar del Plata).

113. *Laterallus leucopyrrhus*. (Vieillot, 1819).  
Gallinetita. Burrito. Burrito de patas rojas.  
Distr.: Area 1.
114. *Laterallus melanophaius melanophaius*. (Vieillot, 1819).  
Gallinetita. Burrito. Burrito silbón.  
Distr.: Area 1 (San Isidro, Avellaneda, La Plata).
115. *Coturnicops notata notata*. (Gould, 1841).  
Gallinetita de pintas blancas. Gallinetita enana.  
Distr.: Area 1 (Río de la Plata, La Plata).
116. *Neocrex erythrops erythrops*. (Scater, 1867).  
Gallineta pico rojo. Cocha polla.  
Distr.: Buenos Aires sin más especificación.
117. *Porphyriops melanops melanops*. (Vieillot, 1819).  
Gallineta de cara negra.  
Distr.: Areas 1 y 3.
118. *Gallinula chloropus galeata*. (Lichtenstein, 1818).  
Gallineta con casco. Pollona. Polla de agua común.  
Distr.: Areas 1 y 3.
119. *Ionornis martinica*. (L., 1766).  
Gallineta azul. Pollona azul.  
Distr.: Area 1 (Zelaya, Avellaneda).

Subfamilia FULICINOS (*Fulicinae*).

120. *Fulica armillata*. Vieillot, 1817.  
Gallareta. Gallareta de ligas rojas.  
Distr.: Toda la provincia.
121. *Fulica leucoptera*. Vieillot, 1817.  
Gallareta. Gallareta de alas blancas.  
Distr.: Toda la provincia.
122. *Fulica rufifrons*. Philippi y Landbeck, 1861.  
Gallareta. Gallareta de pico rojo.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Orden CARADRIFORMES (*Charadriiformes*).

Suborden CARADRIOS (*Charadrii*).

Superfamilia JACANOIDEOS (*Jacanoidea*).

Familia JACANIDOS (*Jacanidae*).

123. *Jacana spinosa jacana*. (L., 1766).  
Jacana. Gallito de agua. Aguapeazó.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia ROSTRATULIDOS (*Rostratulidae*).

124. *Nycticryphes semicollaris*. (Vieillot, 1816).  
Agachona. Aguatero.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia HEMATOPODIDOS (*Haematopodidae*).

125. *Haematopus ostralegus durnfordi*. Sharpe, 1896.  
Ostrero.  
Distr.: Costa atlántica (Cabo San Antonio. Ajó, General Lavalle, Mar Chiquita).

Familia CARADRIDOS (*Charadriidae*).  
Subfamilia VANELLINOS (*Vanellinae*).

126. *Belonopterus cayennensis lampronotus*. (Wagler, 1827).  
Tero. Teru-teru.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia CARADRINOS (*Charadriinae*):

127. *Squatarola squatarola*. (L., 1758).  
Chorlo gris.  
Distr.: Cita aislada en General Lavalle.
128. *Pluvialis dominica dominica*. (P. L. S. Müller, 1776).  
Chorlo pampa. Chorlo dorado.  
Distr.: Toda la provincia.
129. *Charadrius collaris*. Vieillot, 1818.  
Chorlito de collar. Arenero.  
Distr.: Areas 1 y 3 (Zelaya, Cap. Federal, Punta Lara, Gral. Lavalle).
130. *Charadrius falklandicus*. Latham, 1790.  
Chorlo playero de la Patagonia. Angelito.  
Distr.: Toda la provincia.
131. *Charadrius hiaticula semipalmatus*. Bonaparte, 1825.  
Batuirá. Chorlo semipalmado.  
Distr.: Cita aislada en playas de Quequén.
132. *Oreopholus ruficollis*. (Wagler, 1829).  
Chorlo cabezón.  
Distr.: Areas 1 y 3.

133. *Zonibyx modestus*. (Lichtenstein, 1823).  
Chorlo capela. Chorlo de invierno.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia ESCOLOPACIDOS (*Scolopacidae*).  
Subfamilia TRINGINOS (*Tringinae*).

134. *Bartramia longicauda*. (Bechstein, 1802).  
Batitú.  
Distr.: Areas 1 y 3.
135. *Numenius borealis*. (J. R. Forster, 1772).  
Chorlo de pico corvo.  
Distr.: Areas 1 y 3 (prácticamente extinguido).
136. *Numenius phaeopus hudsonicus*. Latham, 1790.  
Chorlo grande de pico corvo. Chorlo de Hudson.  
Distr.: Area 1 (Zelaya).
137. *Limosa haemastica*. (L., 1758).  
Becasina de mar. Becasa.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
138. *Tringa flavipes*. (Gmelin, 1789).  
Chorlo menor de patas amarillas.  
Distr.: Areas 1 y 3.
139. *Tringa melanoleuca*. (Gmelin, 1789).  
Chorlo grande patas amarillas.  
Distr.: Toda la provincia.
140. *Tringa nebularia*. (Gunnerus, 1767).  
Chorlo boreal.  
Distr.: Presencia dudosa.
141. *Tringa solitaria cinnamomea*. (Brewster, 1890).  
Chorlito de manchas acanaladas.  
Distr.: Areas 1 y 3.
142. *Tringa solitaria solitaria*. Wilson, 1813.  
Chorlito solitario.  
Distr.: Areas 1 y 3. (Avellaneda, Ranchos, Azul).
143. *Actitis macularia*. (L., 1766).  
Chorlo manchado.  
Distr.: Areas 1 y 3 (Zelaya, Río Ajó).

Subfamilia ESCOLOPACINOS (*Scolopacinae*).

144. *Limnodromus scolopaceus*. (Say, 1823).  
Becasina migratoria.  
Distr.: Area 3 (Santo Domingo).
145. *Capella paraguayiae magellanica*. (King, 1828).  
Becasina del sur.  
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
146. *Capella paraguayiae paraguayiae*. (Vieillot, 1816).  
Becasina. Agachona.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
147. *Capella undulata gigantea*. (Temminck, 1826).  
Becasa grande.  
Distr.: Sin especificación de localidad.

Subfamilia EROLINOS (*Erolinae*).

148. *Calidris canutus rufus*. (Wilson, 1813).  
Chorlo rojizo.  
Distr.: Areas 1 y 3 (Avellaneda, Cabo San Antonio, San Clemente, Ajó).
149. *Crocethia alba*. (Pallas, 1764).  
Chorlito blanco.  
Distr.: Areas 1 y 3.
150. *Erolia bairdi*. (Coues, 1861).  
Pollito de mar. Sacha pollito.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
151. *Erolia fuscicollis*. (Vieillot, 1819).  
Carachilla. Chorlito rabadilla blanca.  
Distr.: Toda la provincia.
152. *Erolia melanota*. (Vieillot, 1819).  
Chorlito de lomo negro.  
Distr. Areas 1, 2, 3.
153. *Micropalama himantopus*. (Bonaparte, 1826).  
Chorlito palmeado.  
Distr.: Areas 1 y 3.
154. *Tryngites subruficollis*. (Vieillot, 1819).  
Chorlo garganta blanca acanelada.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia RECURVIROSTRIDOS (*Recurvirostridae*).

Subfamilia RECURVIROSTINOS (*Recurvirostrinae*).

155. *Himantopus himantopus melanurus*. Vieillot, 1817.

Tero real.

Distr.: Toda la provincia.

Familia FALAROPODIDOS (*Phalaropodidae*).

156. *Phalaropus fulicarius*. (L., 1758).

Chorlito de mar.

Distr.: Mención sin localidad especificada.

157. *Steganopus tricolor*. Vieillot, 1819.

Chorlito de tres colores.

Distr.: Areas 1, 2, 3.

Superfamilia TINOCOROIDEOS (*Thinocoroidea*).

Familia TINOCÓRIDOS (*Thinocoridae*).

158. *Thinocorus rumicivorus rumicivorus*. Eschscholtz, 1829.

Chorlo agachón. Agachona. Dormilona.

Distr.: Toda la provincia.

Superfamilia QUIONIDOIDEOS (*Chionidoidea*).

Familia QUIONIDIDOS (*Chionididae*).

159. *Chionis alba*. (Gmelin, 1879).

«Paloma» antártica. Pico de estuche.

Distr.: Accidental en la costa atlántica.

Suborden LARIOS (*Lari*).

Familia ESTERCORARIDOS (*Stercorariidae*).

160. *Catharacta skua antarctica*. (Lessón, 1831).

Skua.

Distr.: Ocasional en área 1 (Rosas).

161. *Catharacta skua chilensis*. (Bonaparte, 1857).

Skua.

Distr.: Ocasional en área 1 (Avellaneda).

162. *Stercorarius longicaudus*. Vieillot, 1819.  
Gaviota de cola larga.  
Distr.: Ocasional en área 3 (25 km. al sur de Cabo San Antonio).
163. *Stercorarius parasiticus*. (L., 1758).  
Gaviota de rapiña.  
Distr.: Costa atlántica.

Familia LARIDOS (*Laridae*).  
Subfamilia LARINOS (*Larinae*).

164. *Larus belcheri*. Vigors, 1829.  
Gaviota cocinera de cola blanca y negra.  
Distr.: Costa atlántica.
165. *Larus cirrocephalus cirrocephalus*. Vieillot, 1818.  
Gaviota de cabeza gris. Gaviota de capucho gris.  
Distr.: Toda la provincia.
166. *Larus marinus dominicanus*. Lichtenstein, 1823.  
Gaviota cocinera. Gaviotón.  
Distr.: Toda la provincia.
167. *Larus ridibundus maculipennis*. Lichtenstein, 1823.  
Gaviota capucho café. Gaviota cabeza parda.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ESTERNINOS (*Sterninae*).

168. *Phaetusa simplex*. Gmelin, 1789.  
Gaviotín. Atí.  
Distr.: Area 1 (Baradero, Avellaneda, Belgrano).
169. *Gelochelidon anglica grönvoldi*. Mathews, 1912.  
Gaviotín de patas y pico negros.  
Distr.: Areas 1, 2, 3 y norte de 4.
170. *Sterna hirundinacea*. Lesson, 1831.  
Golondrina de mar.  
Distr.: Costa atlántica (Río de la Plata, Quilmes, Cabo San Antonio).
171. *Sterna hirundo hirundo*. L., 1758.  
Golondrina de mar de pico y dedos bermejos.  
Distr.: Ocasional en la costa atlántica (Mar del Plata).

172. *Sterna paradisea*. Pontoppidan, 1763.  
Gaviota ártica. Golondrina ártica.  
Distr.: Citas aisladas para la costa del Río de la Plata y «frente a Mar del Plata».
173. *Sterna superciliaris*. Vieillot, 1819.  
Gaviotín de ceja blanca. Gaviotín chico.  
Distr.: Area 1 (Baradero, Avellaneda).
174. *Sterna trudeaui*. Audubon, 1838.  
Gaviotín de caperuza y nuca blancas.  
Distr.: Areas 1 y 3.
175. *Thalasseus maximus maximus*. (Boddaert, 1783).  
Gaviotín real. Gaviotín mayor de pico anaranjado.  
Distr.: Costa atlántica (estuario del Río de la Plata, Tuyú, Cabo San Antonio).

Familia RINCOPIDOS (*Rynchopidae*).

176. *Rynchops nigra intercedens*. Saunders, 1895.  
Rayador. Pico tijera.  
Distr.: Areas 1 y 3, y norte de la 4.

Orden COLUMBIFORMES (*Columbiformes*).

Familia COLUMBIDOS (*Columbidae*).

177. *Columba maculosa maculosa*. Temminck, 1813.  
Paloma de monte de alas manchadas. Paloma grande de alas manchadas.  
Considerada dañina.  
Distr.: Toda la provincia.
178. *Columba picazuro picazuro*. Temminck, 1813.  
Paloma turca. Picazuro.  
Distr.: Toda la provincia.
179. *Zenaidura auriculata chrysauchenia*. (Reichenbach, 1847).  
Paloma torcaz. Torcaza. Tórtola. Paloma torcaz común. Considerada dañina.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
180. *Columbina picui picui*. (Temminck, 1813).  
Torcacita. Palomita. Picu-í.  
Distr.: Toda la provincia.
181. *Leptotila verreauxi chlorauchenia*. (Giglioli y Salvadori, 1870).  
Paloma de monte. Paloma montaraz. Paloma ala colorada común.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Orden PSITACIFORMES (*Psittaciformes*).

Familia PSITACIDOS (*Psittacidae*).

Subfamilia PSITACINOS (*Psittacinae*).

182. *Thectocercus acuticaudatus acuticaudatus*. (Vieillot, 1817).  
Loro de los palos. Calancate.  
Distr.: Ocasional en área 2.
183. *Cyanoliseus patagonus patagonus*. (Vieillot, 1817).  
Loro barranquero. Considerada plaga.  
Distr.: Toda la provincia.
184. *Myopsitta monacha monacha*. (Boddaert, 1783).  
Cotorrita de Buenos Aires. Cata común. Monjita. Considerada plaga.  
Distr.: Areas 1 y 3.
185. *Amazona aestiva xanthopteryx*. (Berlepsch, 1896).  
Loro hablador. Loro de Castilla. Loro real.  
Distr.: Cita dudosa para el área 2.
186. *Amazona pretrei*. (Temminck, 1830).  
Loro de cabeza roja.  
Distr.: Citado para «Río de la Plata», aunque quizás sea para el Uruguay.

Orden CUCULIFORMES (*Cuculiformes*).

Familia CUCULIDOS (*Cuculidae*).

Subfamilia FENICOFEINOS (*Phaenicophaeinae*).

187. *Coccyzus americanus americanus*. L., 1758.  
Cuclillo de pico amarillo.  
Distr.: Area 1.
188. *Coccyzus melacoryphus*. Vieillot, 1817.  
Cuclillo de pico negro. Col-col.  
Distr.: Area 1.
189. *Micrococcyx cinereus*. (Vieillot, 1817).  
Ceniciento. Cuclillo de ojo colorado.  
Distr.: Area 1.
190. *Piaya cayana macroura*. Gambel, 1849.  
Alma de gato.  
Distr.: Accidental en áreas 1 y 3 (Villa Elisa, Liggenia, Ptdo. Lavalle).

Subfamilia CROTOFAGINOS (*Crotophaginae*).

191. *Crotophaga major*. Gmelin, 1788.  
Pirincho negro grande.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Avellaneda. Alrededores Cap. Federal).
192. *Guira guira*. (Gmelin, 1788).  
Pirincho. «Urraca». Pinchirracá.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia NEOMORFINOS. (*Neomorphae*).

193. *Tapera naevia chochi*. (Vieillot, 1817).  
Crispín. Crespín. Chochí.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Hudson).

Orden ESTRIGIFORMES (*Strigiformes*).

Familia TITONIDOS (*Tytonidae*).

Subfamilia TITONINOS (*Tytoninae*).

194. *Tyto alba tuídara*. (J. E. Gray, 1829).  
Lechuzón de los campanarios. Lechuzón de iglesia.  
Distr.: Toda la provincia.

Familia ESTRIGIDOS (*Strigidae*).

Subfamilia BUBONINOS (*Buboninae*).

195. *Otus choliba choliba*. (Vieillot, 1817).  
Búho chico. Ñacurutucito. Choliba.  
Distr.: Área 1.
196. *Bubo virginianus nacurutu*. (Vieillot, 1817).  
Ñacurutú. Búho.  
Distr.: Toda la provincia.
197. *Glaucidium nanum*. (King, 1827).  
Caburé. Rey de los pajaritos.  
Distr.: Toda la provincia.
198. *Speotyto cunicularia cunicularia*. (Molina, 1782).  
Lechuza de las vizcacheras. Lechucita de las cuevas.  
Lechuza de campo.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia ESTRIGINOS (*Striginae*).

199. *Rhinoptynx clamator midas*. (Schlegel, 1862).  
Buho orejudo. Buho chuchumeco.  
Distr.: Area 1.
200. *Asio flammeus suinda*. (Vieillot, 1817).  
Lechuzón. Lechuzón de campo. Lechuzón de los pajonales.  
Suindá.  
Distr.: Toda la provincia.

Orden CAPRIMULGIFORMES (*Caprimulgiformes*).

Suborden CAPRIMULGIOS (*Caprimulgi*).

Familia NICTIBIDOS (*Nyctibiidae*).

201. *Nyctibius griseus griseus*. (Gmelin, 1789).  
Urutaú. Cacuí.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Zelaya).

Familia CAPRIMULGIDOS (*Caprimulgidae*).

Subfamilia CORDEILINOS (*Chordeilinae*).

202. *Chordeiles minor minor*. (J. R. Forster, 1771).  
Añapero.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Avellaneda. Alrededores La Plata).
203. *Podager nacunda nacunda*. (Vieillot, 1817).  
Dormilón. Nacundá.  
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.

Subfamilia CAPRIMULGINOS (*Caprimulginae*).

204. *Setopagis parvula parvula*. (Gould, 1837).  
Dormilón.  
Distr.: Area 1.
205. *Systemura longirostris longirostris*. (Bonaparte, 1825).  
Tarpuí.  
Distr.: Areas 1 y 3.
206. *Hydropsalis brasiliana furcifera*. (Vieillot, 1817).  
Ataja camino. Chumulucuco. Dormilón de cola larga.  
Distr.: Area 1 (Isla Martín García, Punta Lara).

207. *Eleothreptus anomalus*. (Gould, 1837).  
Dormilón.  
Distr.: Area 1 (Quilmes).

Orden APODIFORMES (*Apodiformes*).  
Suborden TROQUILIOS (*Trochili*).  
Familia TROQUILIDOS (*Trochilidae*).  
Subfamilia TROQUILINOS (*Trochilinae*).

208. *Hylocharis chrysurus*. (Shaw, 1812).  
Picaflor bronceado.  
Distr.: Area 1 y 3.
209. *Hylocharis cyanus cyanus*. (Vieillot, 1818).  
Picaflor azul de garganta blanca.  
Distr.: Accidental área 3 (Necochea).
210. *Hylocharis sapphirina latirostris*. (Wied., 1832).  
Picaflor azul de garganta roja.  
Distr.: Area 1 (sin localidad especificada).
211. *Chlorostilbon ? lucidus lucidus*. Shaw, 1811.  
Picaflor verde común. Tente en el aire.  
Distr.: Areas 1 y 3.
212. *Sephanoides galeritus*. (Molina, 1782).  
Picaflor de corona rojo anaranjada.  
Distr.: Ocasional en área 1 (9 de Julio).
213. *Heliomaster furcifer*. (Shaw, 1811).  
Picaflor de garganta rojiza.  
Distr.: Area 1 (Baradero, Escobar, La Plata).

Orden CORACIFORMES (*Coraciiformes*).  
Suborden ALCEDINOS (*Alcedines*).  
Familia ALCEDINIDOS (*Alcedinidae*).

214. *Megaceryle torquata stellata*. (Meyen, 1834).  
Martín pescador grande del sur.  
Distr.: Area 4 (sin localidad especificada).
215. *Megaceryle torquata torquata*. (L., 1766).  
Martín pescador grande. Matraca.  
Distr.: Area 1.

216. *Chloroceryle amazona*. (Latham, 1790).  
Martín pescador mediano.  
Distr.: Areas 1 y 3.
217. *Chloroceryle americana mathewsi*. Laubmann, 1927.  
Martín pescador chico. Martín chico.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Orden PICIFORMES (*Piciformes*).

Suborden PICOS (*Pici*).

Familia PICIDOS (*Picidae*).

Subfamilia PICINOS (*Picinae*).

218. *Colaptes campestroides*. (Malherbe, 1849).  
Carpintero campestre.  
Distr.: Toda la provincia.
219. *Leuconerpes candidus*. (Otto, 1796).  
Carpintero blanco. Tura.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Baradero).
220. *Chrysoptilus melanolaimus perplexus*. Cory, 1919.  
Carpintero de gorro rojo.  
Distr.: Areas 1 y 3.
221. *Scapanus leucopogon*. (Valenciennes, 1826).  
Carpintero negro de lomo blanco.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Baradero).
222. *Dytiopicus mixtus mixtus*. (Boddaert, 1783).  
Carpintero chorreado.  
Distr.: Area 1.

Orden PASERIFORMES (*Passeriformes*).

Familia DENDROCOLAPTIDOS (*Dendrocolaptidae*).

223. *Lepidocolaptes angustirostris praedatus*. (Cherrie, 1916).  
Trepador del litoral.  
Distr.: Area 1 (Capital Federal y alrededores).
224. *Drymornis bridgesi*. (Eyton, 1849).  
Chinchero grande.  
Distr.: Area 1 (Monte Grande).

Familia FURNARIDOS (*Furnariidae*).  
Subfamilia FURNARINOS (*Furnariinae*).

225. *Geositta cunicularia cunicularia*. (Vieillot, 1816).  
Camínera. Corre caminos.  
Distr.: Toda la provincia.
226. *Furnarius rufus rufus*. (Gmelin, 1788).  
Hornero. Casero. Caserito.  
Distr.: Toda la provincia.
227. *Cinclodes fuscus fuscus*. (Vieillot, 1818).  
Meneacola.  
Distr.: Toda la provincia.
228. *Upucerthia dumetaria dumetaria*. Geoffroy, 1832.  
Bandurrita común.  
Distr.: Toda la provincia.
229. *Limnornis curvirostris*. Gould, 1839.  
Pajera pico curvo.  
Distr.: Area 1.

Subfamilia SINALAXINOS (*Synallaxinae*).

230. *Phleocryptes melanops melanops*. (Vieillot, 1817).  
Junquero. Siete cuchillas común.  
Distr.: Toda la provincia.
231. *Leptasthenura aegitaloides vallida*. Dabbene, 1920.  
Arañero. Siete colas.  
Distr.: Area 4 (Río Negro).
232. *Leptasthenura platensis*. Reichenbach, 1853.  
Coludito copetón. Siete colas.  
Distr.: Areas 1 y 3.
233. *Schoeniophylax phryganophila*. (Vieillot, 1817).  
Chotoy.  
Distr.: Area 1 (Avellaneda, Punta Lara).
234. *Synallaxis albescens australis*. Zimmer, 1935.  
Pijuí. Todavoz.  
Distr.: Area 1.

235. *Synallaxis frontalis frontalis*. Pelzeln, 1859.  
Pijuí común; Roraima.  
Distr.: Area 1 (San Isidro, Avellaneda).
236. *Synallaxis spixi spixi*. Sclater, 1856.  
Pijuí. Chicli.  
Distr.: Area 1.
237. *Certhiaxis cinnamomea russeola*. (Vieillot, 1817).  
Curutié.  
Distr.: Area 1.
239. *Cranioleuca sulphurifera*. (Burmeister, 1868).  
Garganta amarilla.  
Distr.: Areas 1, 3 y 4.
240. *Asthenes baeri*. (Berlepsch, 1906).  
Coludo. Canastero argentino.  
Distr.: Area 1 (Río Santiago).
241. *Asthenes hudsoni*. (Sclater, 1874).  
Canastero. Cola aguda. Punera.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
242. *Asthenes maluroides*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Canasterito. Coludo enano.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.
243. *Asthenes modesta australis*. Hellmayr, 1925.  
Canastero. Coludo.  
Distr.: Area 4 (Río Negro, Sierra de la Ventana).
244. *Asthenes patagonica*. (d'Orbigny, 1839).  
Canastero patagónico.  
Distr.: Area 4 (Río Negro).
245. *Asthenes pyrrholeuca flavogularis*. (Gould, 1839).  
Coludo. Canastero coludo.  
Distr.: Toda la provincia.
246. *Phacellodomus ruber*. (Vieillot, 1817).  
Espinero grande. Anumbí rojo de Azara.  
Distr.: Area 1.
247. *Phacellodomus rufifrons sincipitalis*. Cabanis, 1883.  
Espinero de frente roja.  
Distr.: Area 1.

248. *Phacelodomus sibilatrix*. Sclater, 1879.  
Espinerito.  
Distr.: Area 1 (Pacheco, Monte Grande).
249. *Phacelodomus striaticollis striaticollis*. (Laffr. y d'Orb., 1838).  
Leñatero. Espinero.  
Distr.: Areas 1 y 3.
250. *Anumbius anumbi*. (Viellot, 1817).  
Añumbí. Leñatero. Espinero.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia FILIDORINOS (*Phylidorinae*).

251. *Pseudoseisura lophotes*. (Reichenbach, 1853).  
Caserote.  
Distr.: Area 1 (orillas del Río de la Plata).
252. *Pseudoseisura gutturalis*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1838).  
Caserote. Chuchumenta. Chorlote.  
Distr.: Area 4 (Río Negro).
253. *Xenotistes rufosuperciliatus acritus*. (Oberholser, 1901).  
Titirí.  
Distr.: Area 1 (Capital Federal, La Plata).
254. *Xenotistes rufosuperciliatus oleagineus*. (Sclater, 1884).  
Titirí.  
Distr.: Area 2.

Familia FORMICARIDOS (*Formicariidae*).

Subfamilia FORMICARINOS (*Formicariinae*).

255. *Thamnophilus ruficapillus ruficapillus*. Vieillot, 1816.  
Choca menor. Batara.  
Diestr.: Area 1.

Familia RINOCRIPTIDOS (*Rhinocryptidae*).

256. *Rhinocrypta lanceolata*. (Geoffroy, 1832).  
Gallito de las rocas. Gallito de agua.  
Distr.: Area 4 (orillas del Río Negro).

Familia COTINGIDOS (*Cotingidae*).

257. *Pachyramphus polychropterus spixi*. (Swainson, 1837).  
Anambé común.  
Distr.: Area 1.

Familia TIRANIDOS (*Tyrannidae*).

Subfamilia FLUVICOLINOS (*Fluvicolinae*).

258. *Agriornis microptera microptera*. Gould, 1839.  
Zorzal de campo. Mero común.  
Distr.: Toda la provincia.
259. *Agriornis montana leucura*. Gould, 1839.  
Mero cordillerano del sur. Gaucho.  
Distr.: Area 4 (Sierra de la Ventana).
260. *Xolmis cinerea*. (Vieillot, 1816).  
Escarchero. Monjita escarchera.  
Distr.: Areas 1 y 3.
261. *Xolmis coronata*. (Vieillot, 1823).  
Animita. Monjita coronada. Aurora.  
Distr.: Toda la provincia.
262. *Xolmis dominicana*. (Vieillot, 1823).  
Monjita dominica. Monjita negra.  
Distr.: Toda la provincia.
263. *Xolmis irupero*. (Vieillot, 1823).  
Monjita blanca. Monjita. Irupero.  
Distr.: Area 1.
264. *Xolmis murina*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Monjita. Tile.  
Distr.: Areas 1, 2, 4.
265. *Xolmis rubetra*. (Burmeister, 1860).  
Monjita rojiza. Diucón rojizo.  
Distr.: Areas 1 y 4.
266. *Muscisaxicola macloviana mentalis*. Laffresnaye y d'Orbigny, 1837.  
Tontito.  
Distr.: Areas 1 y 4 (Lomas de Zamora, Rosas, Patagones, Bahía Blanca).
267. *Lessonia rufa rufa*. (Gmelin, 1789).  
Soprepuesto común.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.

268. *Neoxolmis rufiventris*. (Vieillot, 1823).  
Pájaro bobo. Cazamoscas. Pepoazá.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.
269. *Yetapa risora*. (Vieillot, 1824).  
Yetapá chica. Tijereta de las pajas.  
Distr.: Area 1 (Río Luján, Lomas de Zamora).
270. *Knipolegus aterrimus aterrimus*. Kaup, 1853).  
Viudita de la sierra.  
Distr.: Dudoso en el área 4.
271. *Phaeotriccus hudsoni*. (Sclater, 1872).  
Remoloncito.  
Distr.: Areas 1 y 4 (San Isidro, Río Negro, Río Colorado).
272. *Hymenops perspicillata perspicillata*. (Gmelin, 1789).  
Pico de plata. Viudita.  
Distr.: Areas 1, 2, 3 y marginal de la 4.
273. *Fluvicola pica albiventer*. (Spix, 1825).  
Viudita. Viudita del agua. Pampita.  
Distr.: Area 1.
274. *Pyrocephalus rubinus rubinus*. (Boddaert, 1783).  
Churrinche.  
Distr.: Areas 1 y 3.
275. *Satrapa icterophrys icterophrys*. (Vieillot, 1818).  
Amarillo.  
Distr.: Areas 1 y 3.
276. *Machetornis rixosa rixosa*. (Vieillot, 1819).  
Pica buey. Ovejero. Margarita. Matadura. Domador.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Subfamilia TIRANINOS (*Tyranninae*).

277. *Muscivora tyrannus tyrannus*. (L., 1766).  
Tijereta.  
Distr.: Toda la provincia.
278. *Tyrannus melancholicus melancholicus*. Vieillot, 1819.  
Benteveo real. Huequero.  
Distr.: Presencia probable en el área 4 sin localidad especificada.

279. *Empidonomus aurantio-atrocristatus aurantio-atrocristatus*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Churí. Tuc.  
Distr.: «Buenos Aires».
280. *Myiodynastes solitarius*. (Vieillot, 1819).  
Benteveo chico. Solitario. Bicho overo. Huequero.  
Distr.: Area 1.
281. *Pitangus sulphuratus bolivianus*. (Laffresnaye, 1852).  
Benteveo. Bichofeo, Bienteveo. Pito Juan.  
Distr.: Toda la provincia.

Subfamilia MIARQUINOS (*Myiarchinae*).

282. *Myiarchus swainsoni ferocior*. Cabanis, 1888.  
Burlisto de pico crema. Burlisto ceniciento.  
Distr.: Area 1 (Avellaneda).
283. *Myiarchus ferox australis*. Hellmayr, 1927.  
Burlisto irré. Irré.  
Distr.: Area 1 (sin localidad especificada).
284. *Empidonax euleri argentinus*. (Cabanis, 1868).  
Guacará. Papa hormigas.  
Distr.: Area 1 (Pacheco).
285. *Myiophobus fasciatus flammiceps*. (Temminck, 1822).  
Mosqueta.  
Distr.: Area 1.

Subfamilia EUSCARTMINOS (*Euscarthminae*).

286. *Pseudocolopteryx flaviventris*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Piojito amarillo.  
Distr.: Areas 1 y 3.
287. *Pseudocolopteryx sclateri*. (Oustalet, 1892).  
Doradito copetón.  
Distr.: Area 1 (Las Rosas).
288. *Habrura pectoralis pectoralis*. (Vieillot, 1817).  
Habrura. Tachurí.  
Distr.: Areas 1 y 4 (Zelaya, Las Rosas, Bahía Blanca).

Subfamilia SERPOFAGINOS (*Serpophaginae*).

289. *Tachuris rubrigastra rubrigastra*. (Vieillot, 1817).  
Siete colores de laguna. Papa-pirí.  
Distr.: Toda la provincia.
290. *Spizitornis flavirostris flavirostris*. (Sclater y Salvin, 1876).  
Cachurita pico amarillo.  
Distr.: Dudosa en la provincia, sin cita documentada.
291. *Spizitornis parulus patagonicus*. Hellmayr, 1920.  
Cachudita.  
Distr. Area 4 (cercañas del Río Negro).
292. *Stigmatura budytoides flavocinerea*. (Burmeister, 1861).  
Rabicano. Rabicano del sur.  
Distr.: Area 4 (cercañas del Río Negro).
293. *Serpophaga nigricans*. (Vieillot, 1817).  
Piojito gris. Oscurito. Piojito de las riberas.  
Distr.: Areas 1 y 3.
294. *Serpophaga subcristata*. (Vieillot, 1817).  
Piojito. Turí-turí. Tuí-tuí.  
Distr.: Areas 1 y 3.
295. *Xenopsaris albinucha albinucha*. (Burmeister, 1868).  
Tijerilla.  
Distr.: Area 1 (orillas Río de la Plata, Tigre).

Subfamilia ELENINOS (*Elaeniinae*).

296. *Elaenia albiceps chilensis*. Hellmayr, 1927.  
Fío fío. Silbador.  
Distr.: Area 1.
297. *Elaenia parvirostris*. (Pelzeln, 1868).  
Afrechero. Fío fío afrechero. Silbador.  
Distr.: Areas 1 y 3.
298. *Elaenia strepera*. Cabanis, 1883.  
Fío fío mediano. Ceniciento. Fío fío vocinglero.  
Distr.: Accidental.
299. *Sublegatus modestus modestus*. (Wied, 1831).  
Copetón.  
Distr.: Area 1 (Isla Martín García).

Familia FITOTOMIDOS (*Phytotomidae*).

300. *Phytotoma rutila rutila*. Vieillot, 1818.  
Quejón. Cortarramas. Queo. Carnerito.  
Distr.: Areas 1 y 4.

Familia HIRUNDINIDOS (*Hirundinidae*).

301. *Progne chalybea domestica*. (Vieillot, 1817).  
Golondrina doméstica. Golondrina azul doméstica.  
Distr.: Areas 1 y 3.
302. *Progne modesta elegans*. Baird, 1865.  
Golondrina negra doméstica.  
Distr.: Areas 2, 3, 4.
303. *Phaeoprogne tapera fusca*. (Vieillot, 1817).  
Golondrina de los hornos.  
Distr.: Areas 1 y 3.
304. *Petrochelidon pyrrhonota pyrrhonota*. (Vieillot, 1817).  
Golondrina de rabadilla parda.  
Distr.: Areas 1 y 3.
305. *Stelgidopteryx ruficollis ruficollis*. (Vieillot, 1817).  
Golondrina de los campos. Golondrina de garganta leonada.  
Distr.: Area 1.
306. *Alopochelidon fucata*. (Temminck, 1822).  
Golondrina chica. Golondrina de cara castaña.  
Distr.: Area 1.
307. *Pygochelidon cyanoleuca patagonica*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Golondrina azul.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.
308. *Hirundo rustica erythrogaster*. Boddaert, 1783.  
Golondrina tijereta.  
Distr.: Toda la provincia.
309. *Iripodrocne albiventer*. (Boddaert, 1783).  
Golondrina blanca.  
Distr.: Dudosa para Capital Federal.
310. *Iripodrocne leucopyga*. (Meyen, 1834).  
Golondrina rabadilla blanca.  
Distr.: Areas 2, 3, 4.

311. *Iridoprocne leucorrhoea*. (Vieillot, 1817).  
Golondrina de los campos.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia CORVIDOS (*Corvidae*).  
Subfamilia GARRULINOS (*Garrulinae*).

312. *Cyanocorax chrysops chrysops*. (Vieillot, 1818).  
Acahé. Urraca azul y blanca.  
Distr.: Ocasional área 1.

Familia TROGLODITIDOS (*Troglodytidae*).

313. *Cistothorus platensis platensis*. (Latham, 1790).  
Ratona de campo.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
314. *Troglodytes musculus bonariae*. Hellmayr, 1919.  
Tacuarita. Ratona. Ratona casera.  
Distr.: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4.
315. *Troglodytes musculus chilensis*. Lesson, 1830.  
Ratona común. Tacuarita. Cucurucha. Ratona casera.  
Distr.: Toda la provincia.

Familia MIMIDOS (*Mimidae*).

316. *Mimus patagonicus*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Calandria chica. Calandria de la sierra. Calandria de la Patagonia.  
Distr.: Area 4 (Papín).
317. *Mimus saturninus modulator*. (Gould, 1836).  
Calandria. Calandria común.  
Distr.: Toda la provincia menos el sur de área 4.
318. *Mimus triurus* (Vieillot, 1818).  
Calandria de tres colas. Calandria real.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia TURDIDOS (*Turdidae*).

319. *Turdus amaurochalinus*. Cabanis, 1851.  
Zorzal blanco. Chalchalero. Mandioca. Saviá.  
Distr.: Area 1.

320. *Turdus rufiventris rufiventris*. Vieillot, 1818.  
Zorzal colorado.  
Distr.: Area 1 (Baradero, Hudson).

Familia SILVIDOS (*Sylviidae*).

Subfamilia POLIOPTILINOS (*Polioptilinae*).

321. *Polioptila dumicola dumicola*. (Vieillot, 1817).  
Piojito azulado.  
Distr.: Areas 1 y 3.

Familia MOTACILIDOS (*Motacillidae*).

322. *Anthus correndera correndera*. Vieillot, 1818.  
Cachirla. Cachila.  
Distr.: Toda la provincia.
323. *Anthus furcatus furcatus*. Laffresnaye y d'Orbigny, 1837.  
Cachirla de uña corta.  
Distr.: Toda la provincia.
324. *Anthus hellmayri brasilianus*. Hellmayr, 1921.  
Cachirla cimarrona.  
Distr.: Area 1.
325. *Anthus lutescens lutescens*. Pucheran, 1855.  
Cachirla chica. Cachirla enana.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.

Familia CICLARIDOS (*Cyclarhidae*).

326. *Cyclarhis gujanensis ochrocephala*. Tschudi, 1845.  
Buen cantor. Juan chiviro.  
Distr.: Area 1.

Familia VIREONIDOS (*Vireonidae*).

327. *Vireo virescens chivi*. (Vieillot, 1817).  
Chivi chivi. Gaviero. Contra maestre.  
Distr.: Area 1.

Familia COMPSOTLIPIDOS (*Compsothlypidae*).

328. *Compsothlypis pitiaiyumi pitiaiyumi*. (Vieillot, 1817).  
Pitiaiyumi.  
Distr.: Areas 1 y 3.

329. *Geothlypis aequinoctialis velata*. (Vieillot, 1807).  
Amarillito.  
Distr.: Area 1.
330. *Basileuterus culicivorus auricapillus*. (Swainson, 1837).  
Pola pula. Coronada.  
Distr.: Area 1 (San Isidro).

Familia PLOCEIDOS (*Ploceidae*).

331. *Passer domesticus domesticus*. (L., 1758).  
Gorrión. Considerada dañina.  
Distr.: Toda la provincia. Introducido y naturalizado.

Familia ICTERIDOS (*Icteridae*).

332. *Archiplanus albirostris*. (Vieillot, 1816).  
Boyero de alas amarillas.  
Distr.: Area 1 (Delta).
333. *Archiplanus solitarius*. (Vieillot, 1816).  
Boyero.  
Distr.: Area 1.
334. *Molothrus badius badius*. (Vieillot, 1819).  
Tordo bayo. Músico. Mulata. Tordo zaino.  
Distr.: Areas 1, 2, 3 y norte de la 4.
335. *Molothrus bonariensis bonariensis*. (Gmelin, 1789).  
Renegrado. Tordo.  
Distr. Toda la provincia.
336. *Molothrus rufo-axillaris*. Cassin, 1866.  
Tordo de pico corto. Violinista.  
Distr.: Areas 1 y 3.
337. *Icterus cayenensis pyrrhopterus*. (Vieillot, 1819).  
Boyerito. Tordo de cobijas canelas.  
Distr.: Area 1.
338. *Agelaius ruficapillus ruficapillus*. Vieillot, 1819.  
Varillero. Tordo de laguna cabeza canela.  
Distr.: Areas 1 y 3.

339. *Agelaius thilius petersi*. Laubmann, 1934.  
Alferez. Paleta.  
Distr.: Areas 1 y 3.
340. *Xanthopsar flavus*. (Gmelin, 1788).  
Tordo de cabeza amarilla.  
Distr.: Areas 1, 2, 3.
341. *Amblyramphus holosericeus*. (Scopoli, 1786).  
Federal. Juan soldado. Blandengue.  
Distr.: Areas 1 y 3.
342. *Gnorimopsar chopi chopi*. (Vieillot, 1819).  
Chopi. Charrúa. Tordo chaqueño. Guirá-hú.  
Distr.: Area 1.
343. *Pseudoleistes guirahuro*. (Vieillot, 1819).  
Guirahuro. Pecho amarillo guirahuro.  
Distr.: Area 1 (Río de la Plata, Avellaneda).
344. *Pseudoleistes virescens*. (Vieillot, 1819).  
Pecho amarillo. Dragón.  
Distr. Toda la provincia.
345. *Leistes militaris superciliaris*. (Bonaparte, 1850).  
Pecho colorado chico. Loica argentina. Tordo militar.  
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
346. *Pezites defilippii*. (Bonaparte, 1850).  
Pecho colorado mediano.  
Distr.: Areas 1 y 3.
347. *Pezites militaris militaris*. (L., 1771).  
Pecho colorado grande. Loica. Loyca.  
Distr. Toda la provincia.
348. *Dolichonyx oryzivorus*. (L., 1758).  
Charlatán. Tordo charlatán.  
Distr.: Area 1.

Familia TRAUPIDOS (*Thraupidae*).

349. *Tanagra chlorotica serrirostris*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Fruterito de la liga. Naranjerito de la liga.  
Distr.: Area 1.

350. *Pipraeidea melanonota melanonota*. (Vieillot, 1819).  
Pico punzón azul y canela.  
Distr.: Area 1 (Moreno, Avellaneda).
351. *Calospiza castanonota*. (Sclater, 1910).  
Tanagra espalda castaña.  
Distr.: Area 1.
352. *Calospiza peruviana*. (Desmarest, 1806).  
Tangara.  
Distr.: Accidental en área 1 («Buenos Aires»).
353. *Stephanophorus diadematus*. (Temminck, 1823).  
Cardenal azul. Lindo azul cabeza blanca.  
Distr.: Area 1.
354. *Thraupis bonariensis bonariensis*. (Gmelin, 1789).  
Naranjero. Siete colores. Frutero. San Lucía.  
Distr.: Areas 1 y 3.
355. *Thraupis cyanoptera*. (Vieillot, 1817).  
Sanasú.  
Distr.: Accidental en área 1 (vecindad de Capital Federal).
356. *Thraupis sayaca sayaca*. (L., 1766).  
Azulejo. Frutero azulejo del Litoral. Sahiobí.  
Distr.: Area 1.
357. *Piranga flava flava*. (Vieillot, 1822).  
Fueguero.  
Distr.: Area 1.
358. *Tachypomus rufus*. (Boddaert, 1783).  
Frutero.  
Distr.: Area 1.

Familia FRINGILIDOS (*Fringillidae*).

Subfamilia RICHMONDENINOS (*Richmondininae*).

359. *Saltator aurantirostris aurantirostris*. Vieillot, 1817.  
Pepitero. Pepitero común. Juan Chiviro común.  
Distr.: Area 1.
360. *Saltator coerulescens coerulescens*. Vieillot, 1817.  
Pico grueso. Juan chiviro pico grueso. Habero. Habá ceniciento.  
Distr.: Area 1 (Baradero).

361. *Gubernatrix cristata*. (Vieillot, 1817).  
Cardenal amarillo.  
Distr. Toda la provincia.
362. *Paroaria coronata*. (Miller, 1766).  
Cardenal.  
Distr.: Areas 1 y 3.
363. *Paroaria capitata*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Cardenal sin copete. Capitá.  
Distr.: Area 1.
364. *Cyanoloxia glauco-caerulea*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Azulejo. Azulejo chico.  
Distr.: Area 1.

Subfamilia CARDUELINOS (*Carduelinae*).

365. *Sporophila caerulescens caerulescens*. (Vieillot, 1817).  
Corbatita común. Gargantilla.  
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
366. *Sporophila collaris melanocephala*. (Vieillot, 1817).  
Corbatita dominó. Dominó. Corbatita del Paraguay.  
Distr.: Area 1.
367. *Sporophila minuta hypoxantha*. Cabanis, 1851.  
Paraguayito. Corbatita paraguayito.  
Distr.: Area 1 (Zelaya).
368. *Sporophila obscura obscura*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Corbatita semillera. Semillero.  
Distr.: Area 1.
369. *Sporophila plumbea plumbea*. (Wied, 1830).  
Patativa. Corbatita patativa.  
Distr.: Area 1 (Zelaya).
370. *Sporophila ruficollis*. Cabanis, 1851.  
Corbatita rojiza.  
Distr.: Area 1 (Zelaya).
371. *Catamenia analis analis*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Semillero común. Corbatita gris.  
Distr.: Area 2 (Santa Elena).

372. *Volatinia jacarina jacarina*. (L., 1766).  
Sierra sierra.  
Distr.: Area 1 (Tigre, Rosas).
373. *Spinus magellanicus magellanicus*. (Vieillot, 1805).  
Cabecita negra. Cabecita negra del oeste.  
Distr. Toda la provincia.
374. *Spinus magellanicus tucumanus*. Todd. 1926.  
Cabecita negra.  
Distr.: Ocasional en área 1 (Quilmes).
375. *Sicalis flaveola pelzelni*. Sclater, 1872.  
Jilguero. Doradito.  
Distr.: Areas 1, 3 y norte de la 4.
376. *Sicalis luteola luteiventris*. (Meyen, 1834).  
Misto. Misto cimarrón.  
Distr. Toda la provincia.

Subfamilia EMBERIZINOS (*Emberizinae*).

377. *Diuca diuca minor*. Bonaparte, 1850.  
Diuca chica.  
Distr.: Area 4 (Río Negro).
378. *Phrygilus gayi caniceps*. Burmeister, 1860.  
Come sebo chico.  
Distr.: Ocasional en área 4 (Sierra de la Ventana).
379. *Phrygilus carbonarius*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Frigilo negro.  
Distr.: Area 4 (Carmen de Patagones).
380. *Phrygilus fruticeti fruticeti*. (Kittlitz, 1832).  
Yal-yal. Rara negra.  
Distr.: Area 4 (Carmen de Patagones).
381. *Haplospiza unicolor*. Cabanis, 1851.  
Cigarra.  
Distr.: Area 1 (San Pedro).
382. *Coryphospingus cucullatus rubescens*. (Swainson, 1825).  
Ará-guirá. Brasita de fuego.  
Distr.: Area 1.

383. *Myospiza humeralis xanthornus*. (Gould, 1839).  
Cachirlito. Manimbé.  
Distr.: Toda la provincia.
384. *Zonotrichia capensis hypoleuca*. (Todd, 1915).  
Chingolo.  
Distr.: Toda la provincia.
385. *Donacospiza albifrons*. (Vieillot, 1817).  
Monterita.  
Distr.: Areas 1 y 3.
386. *Poospiza lateralis cabanisi*. Bonaparte, 1850.  
Miente mi tío. Siete colores de rabadilla roja.  
Distr.: Area 1.
387. *Poospiza melanoleuca*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Chivi chivi. Siete vestidos blanco y negro.  
Distr.: Area 1 (Escobar).
388. *Poospiza nigro-rufa nigro-rufa*. (Laffresnaye y d'Orbigny, 1837).  
Siete vestidos común.  
Distr.: Areas 1, 3, 4.
389. *Poospiza ornata*. (Leybold, 1865).  
Siete vestidos chico. Siete vestidos pintado.  
Distr.: Area 1.
390. *Poospiza torquata pectoralis*. Todd, 1922.  
Siete vestidos de collar. Quién te vistió de collar.  
Distr.: Area 2 (Santa Elena).
391. *Embernagra platensis platensis*. (Gmelin, 1789).  
Juan Chiviro de las pajas. Verdón.  
Distr.: Toda la provincia.
- 

Clase MAMIFEROS (*Mammalia*).  
Orden MARSUPIALES (*Marsupialia*).  
Familia DIDELFIDOS (*Didelphidae*).

1. *Didelphis paraguayensis paraguayensis*. Oken, 1816.  
Comadreja overa. Comadreja picaza. Mbicuré. Micuré.  
Considerada dañina.  
Distr.: Toda la provincia.

2. *Lutreolina crassicaudata bonaria*. Thomas, 1923.  
Comadreja colorada. Mbicuré-pitá. Coligrueso.  
Considerada dañina.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
3. *Minuania fosteri*. (Thomas, 1925).  
*Minuania argentina*.  
Distr.: Sierra de la Tinta en partido de Juárez; probablemente dominio central.
4. *Marmosa pallidior*. (Thomas, 1902).  
Achocaya común.  
Distr.: Dominio central (Sierra de la Ventana).

Orden QUIROPTEROS (*Chiroptera*).

Familia FILOSTOMIDOS (*Phyllostomidae*).

5. *Glossophaga soricina soricina*. (Pallas, 1766).  
Vampiro atrapa moscas.  
Distr.: Dominio subtropical. (La Plata, Capital Federal).
6. *Sturnira lilium lilium*. (Geoffroy, 1810).  
Falso vampiro flor de lis.  
Distr.: Dominio subtropical.

Familia VESPERTILIONIDOS (*Vespertilionidae*).

7. *Myotis albescens*. (Geoffroy, 1806).  
Murciélago chico de vientre blanco.  
Distr.: Dominios subtropical, pampásico y central.
8. *Myotis chiloensis alter*. Miller y Allen, 1928.  
Murciélago oreja de ratón.  
Distr.: Dominio subtropical.
9. *Histiotus montanus*. (Philippi y Landbeck, 1861).  
Murciélago orejudo. Murciélago orejón.  
Distr.: Dominio subtropical, y probablemente dominio pampásico.
10. *Lasiurus borealis blossevillii*. (Lesson y Garnot, 1826).  
Murciélago colorado. Murciélago boreal rojizo.  
Distr.: Dominios subtropical, pampásico y central.
11. *Lasiurus cinereus villosissimus*. (Geoffroy, 1806).  
Murciélago pardo blanquizco de Azara.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico hasta la altura de Mar del Plata.

12. *Dasypterus ega argentinus*. Thomas, 1901.  
Murciélago leonado.  
Distr.: Dominio subtropical.

Familia MOLOSIDOS (*Molossidae*).

13. *Tadarida brasiliensis*. (Geoffroy, 1824).  
Murciélago cola de ratón.  
Distr.: Toda la provincia.
14. *Eumops bonariensis bonariensis*. (Peters, 1874).  
Pequeño moloso de Buenos Aires.  
Distr.: Dominio subtropical (Capital Federal, La Plata), y probablemente nordeste del dominio pampásico.

Orden CARNIVOROS (*Carnivora*).  
Suborden FISIPEDIOS (*Fissipedia*).  
Familia CANIDOS (*Canidae*).

15. *Pseudalopex gymnocercus antiquus*. (Ameghino, 1889).  
Zorro gris común. Zorro de la Pampa. Aguaracháí.  
Considerada dañina.  
Distr.: Toda la provincia.
16. *Pseudalopex gracilis patagonicus*. (Philippi, 1860).  
Zorro.  
Distr.: Probablemente dominio patagónico.

Familia MUSTELIDOS (*Mustelidae*).  
Subfamilia MUSTELINOS (*Mustelinae*).

17. *Galictis cuja huronax*. (Thomas, 1921).  
Hurón menor.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.
18. *Lyncodon patagonicus patagonicus*. (Blainville, 1824).  
Huroncito.  
Distr.: Dominios patagónico y central hasta Bahía Blanca y Guaminí; dominio pampásico (Azul).
19. *Conepatus castaneus castaneus*. (d'Orbigny, 1847).  
Zorrinito. Zorrino chico.  
Distr.: Dominios patagónico y central.

20. *Conepatus suffocans gibsoni*. Thomas, 1921.  
Zorrino común. Zorrillo.  
Distr.: Dominio pampásico.
21. *Conepatus suffocans pampanus*. Thomas, 1921.  
Zorrino común. Zorrillo.  
Distr.: Probablemente dominio central. (Bonifacio).

Subfamilia LUTRINOS (*Lutrinae*).

22. *Lutra platensis*. Waterhouse, 1839.  
Lobito de río.  
Distr.: Dominio subtropical.

Familia FELIDOS (*Felidae*).

Subfamilia FELINOS (*Felinae*).

23. *Lynchailurus pajeros pajeros*. (Desmarest, 1816).  
Gato pajero. Gato de las pajas. Gato de pajonal.  
Distr.: Toda la provincia. En retroceso numérico.
24. *Oncifelis geoffroyi*. (d'Orbigny, 1844).  
Gato montés.  
Distr.: Toda la provincia. En retroceso numérico.
25. *Puma concolor puma*. (Molina, 1782).  
Puma. «León». Considerada dañina.  
Distr.: Dominios central (Ventania), patagónico y probablemente pampásico (Sierra La Brava). En retroceso numérico.

Subfamilia PANTERINOS (*Pantherinae*).

26. *Panthera onca palustris*. (Ameghino, 1888).  
Yaguareté. Yaguar. «Tigre» americano. «Jaguar».  
Distr.: Dominio subtropical (Delta del Paraná). Ha desaparecido del resto de la provincia.

Suborden PINNIPEDOS (*Pinnipedia*).

Familia OTARIDOS (*Otaridae*).

27. *Otaria flavescens*. (Shaw, 1800).  
Lobo marino. Lobo de un pelo.  
Distr.: Costa atlántica y estuario del Río de la Plata. En retroceso numérico.

Familia FOCIDOS (*Phocidae*).  
Subfamilia MONAQUINOS (*Monachinae*).

28. *Lobodon carcinophagus*. (Jacq. y Puch., 1842).  
Foca cangrejera. Foca blanca. Lobo cangrejero.  
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica. Hallazgos en el Río de la Plata (Río Santiago, San Isidro).

Subfamilia CÍSTOFORINOS (*Cystophorinae*).

29. *Mirounga leonina*. (L., 1758).  
Elefante marino. Elefante marino del sur.  
Distr.: Accidental en la costa atlántica. En retroceso numérico.

Orden ROEDORES (*Rodentia*).  
Suborden MIOMORFOS (*Myomorpha*).  
Familia CRICETIDOS (*Cricetidae*).

30. *Oryzomys flavescens*. (Waterhouse, 1837).  
Colilargo del Plata.  
Distr.: Dominio subtropical (Isla Ella en el Delta; La Plata), probablemente dominio pampásico.
31. *Oryzomys delticola*. Thomas, 1917.  
Colilargo.  
Distr.: Dominio subtropical. (Isla Ella en el Delta).
32. *Phyllotis xanthopygus*. (Waterhouse, 1837).  
Pericote de nalga amarillenta.  
Distr.: Dominios patagónico y central hasta Bahía Blanca.
33. *Graomys griseoflavus griseoflavus*. (Waterhouse, 1837).  
Rata amarillenta grande.  
Distr.: Dominio patagónico.
34. *Eligmodontia elegans*. (Waterhouse, 1837).  
«Eligmodonte».  
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca).
35. *Akodon arenicola hunteri*. Thomas, 1917.  
Ratón de las arenas.  
Distr.: Dominio subtropical (Isla Ella en el Delta).
36. *Akodon arenicola beatus*. (Thomas, 1919).  
Ratón de las arenas.  
Distr.: Dominio pampásico.

37. *Akodon benefactus*. Thomas, 1919.  
Distr.: Unica localidad Bonifacio.
38. *Akodon iniscatus iniscatus*. Thomas, 1919.  
Distr.: Unica localidad Bahía Blanca.
39. *Hesperomys murillus murillus*. Thomas, 1916.  
Laucha de campo mediana.  
Distr.: Dominio pampásico (La Plata, Ensenada, Los Talas, Bahía Blanca).
40. *Hesperomys gracilipes*. (Waterhouse, 1837).  
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca).
41. *Hesperomys bimaculatus bimaculatus*. (Waterhouse, 1837).  
Laucha manchada, Ratón manchado.  
Distr.: Dominio subtropical (La Plata).
42. *Hesperomys bimaculatus bonariensis*. Osgood, 1933.  
Laucha manchada, Ratón manchado.  
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca).
43. *Hesperomys laucha*. (Desmarest, 1819).  
Laucha.  
Distr.: Capital Federal.
44. *Oxymycterus nasutus*. (Waterhouse, 1837).  
Ratón hocicudo. Hocicudo.  
Distr.: Dominio subtropical.
45. *Oxymycterus platensis*. Thomas, 1914.  
Hocicudo.  
Distr.: Dominio subtropical (Isla Ella del Delta; Río Santiago).
46. *Reithrodon auritus auritus*. (Desmarest, 1819).  
Ratón conejo de las pampas. Orejón.  
Distr.: Probablemente dominio central.
47. *Reithrodon auritus marinus*. Thomas, 1920.  
Ratón conejo de las pampas. Orejón.  
Distr.: Mar del Plata, probablemente zona costera del dominio pampásico.
48. *Reithrodon typicus typicus*. Waterhouse, 1837.  
Ratón conejo. Orejón.  
Distr.: Dominio subtropical (Baradero).
49. *Holochilus darwini*. Thomas, 1897.  
Rata de agua.  
Distr.: Bahía Blanca.

50. *Holochilus vulpinus*. (Brants, 1827).  
Rata de bañado. Ratón nutria.  
Distr.: Dominio subtropical.
51. *Scapteromys aquaticus*. Thomas, 1920.  
Rata acuática grande.  
Distr.: Dominio subtropical (Río Carabelas e isla Ella en el Delta).
52. *Scapteromys tomentosus*. (Lichtenstein, 1830).  
Rata acuática.  
Distr.: Dominio subtropical (isla Ella en el Delta).
53. *Scapteromys tumidus*. (Waterhouse, 1837).  
Rata acuática.  
Distr.: Dominio subtropical (Río Capitán, en el Delta; La Plata).
54. *Deltamys kempi*. Thomas, 1917.  
Distr.: Dominio subtropical (isla Ella en el Delta).

Suborden HISTRICOMORFOS (*Hystricomorpha*).

Familia CHINCHILIDOS (*Chinchillidae*).

55. *Lagostomus maximus maximus*. (Blainville, 1817).  
Vizcacha. Vizcacha de la Pampa. Considerada plaga.  
Distr.: Dominio pampásico; falta en la parte norte y en la faja costera.
56. *Lagostomus maximus petillidens*. Hollister, 1914.  
Vizcacha. Vizcacha de la Pampa. Considerada plaga.  
Distr.: Dominios patagónico y central con leve penetración al sur del pampásico.

Familia CTENOMIDOS (*Ctenomyidae*).

57. *Ctenomys talarum talarum*. Thomas, 1898.  
Tuco de los talas. Tuco-tuco de los talas. Tucu-tuco de los talas.  
Distr.: Franja de talaes del dominio pampásico, de Los Talas a Monte Veloz. (Río Santiago, Los Talas).
58. *Ctenomys talarum anthoni*. Thomas, 1910.  
Tuco-tuco. Tuco. Oculto.  
Distr.: Probablemente en la franja medanosa atlántica del dominio pampásico, desde Bahía Samborombón al sur (General Lavalle).
59. *Ctenomys porteousi australis*. Rusconi, 1934.  
Tuco-tuco acanelado. Tuco. Oculto.  
Distr.: Necochea.

60. *Ctenomys portecousi portecousi*. Thomas, 1916.  
Tucu-tuco. Tuco. Oculto.  
Distr.: Sudoeste del dominio pampásico y probablemente dominio central (Bonifacio, Papín, El Inca, La Zanja).
61. *Ctenomys mendocinus recessus*. Thomas, 1912.  
Tucu-tuco. Tuco. Oculto.  
Distr.: Dominio central y quizás dominio patagónico (Bahía Blanca).

Familia CAPROMIDOS (*Capromyidae*).

62. *Myocastor coypus bonariensis*. (Geoffrey, 1805).  
Quiyá. Falsa nutria. «Nutria». Coipo. Coipú.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.

Familia CAVIDOS (*Caviidae*).

Subfamilia CAVINOS (*Caviinae*).

63. *Galea musteloides littoralis*. (Thomas, 1901).  
Cuis. Cuis de dientes amarillos.  
Distr.: Parte sur del dominio pampásico, central y probablemente patagónico (Quequén, Bahía Blanca).
64. *Microcavia australis australis*. (Geoffroy y d'Orbigny, 1833).  
Cuis chico de las pampas. Cuis chico.  
Distr.: Dominios patagónicos y central.
65. *Cavia pamparum*. Thomas, 1917.  
Cuis. Cuis de la Pampa. Considerada plaga.  
Distr.: Dominios subtropical y pampásico.

Subfamilia DOLICOTINOS (*Dolichotinae*).

66. *Dolichotis patagonum patagonum*. (Zimmermann, 1780).  
Mara. Marra. Liebre patagónica.  
Distr.: Dominios patagónico y central. En retroceso numérico.

Familia HIDROQUERIDOS (*Hydrochoeridae*).

67. *Hydrochoerus hydrochaeris notialis*. Hollister, 1914.  
Carpincho. Capibara.  
Distr.: Dominio subtropical (Delta del Paraná).

Orden EDENTADOS (*Edentata*).

Suborden DASIPODOIDEOS (*Dasypodoidea*).

Familia CLAMIFORIDOS (*Chlamyphoridae*).

68. *Chlamyphorus truncatus minor*. Lahille, 1895.  
Pichi ciego. Pichi ciego menor.  
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca, Chasicó).

Familia DASIPODIDOS (*Dasypodidae*).

69. *Tolypeutes matacos*. Desmarest, 1804.  
Mataco. Quirquincho bola. Bolita.  
Distr.: Dominios central y patagónico.
70. *Chaetophractus villosus*. (Desmarest, 1819).  
Peludo. Quirquincho peludo.  
Distr.: Toda la provincia.
71. *Zaedyus pichiy pichiy*. (Desmarest, 1804).  
Piche. Piche de orejas cortas.  
Distr.: Dominio central (Bahía Blanca, Sierra de la Ventana, Bonifacio).
72. *Dasypus septemcinctus*. (Schreiber, 1775).  
Mulita. Tatú mulita.  
Distr.: Toda la provincia.

Orden ARTIODACTILOS (*Artiodactyla*).

Familia CAMELIDOS (*Camelidae*).

73. *Lama guanicoe guanicoe*. (Müller, 1776).  
Guanaco. Huanaco.  
Distr.: Sierras del sistema de Ventania.

Familia CERVIDOS (*Cervidae*).

74. *Blastocerus dichotomus*. (Illiger, 1815).  
Ciervo de los pantanos. Ciervo del Delta. Guazú pucú. Guazuncho.  
Distr.: Dominio subtropical (Delta). En retroceso numérico.
75. *Ozotoceros bezoarticus celer*. Cabrera, 1943.  
Venado. Guazú-tí. Ciervo de la pampa.  
Distr. Dominio pampásico. En retroceso numérico acelerado; existiendo únicamente en la zona de General Lavalle.

Orden CETACEOS (*Cetacea*).  
Suborden ODONTOCETOS (*Odontoceti*).  
Familia INIDOS (*Iniidæ*).

76. *Stenodelphis blainvillei*. Gervais, 1847.  
Delfín del Plata. Franciscana.  
Distr.: Costa atlántica y Río de la Plata.

Familia DELFINIDOS (*Delphinidae*).

77. *Prodelphinus coeruleoalbus* (Meyen, 1833).  
Delfín azul.  
Distr.: Costa atlántica.
78. *Prodelphinus longirostris*. (Gray, 1828).  
Delfín de pico largo.  
Distr.: Costa atlántica.
79. *Lagenorhynchus obscurus*. Gray, 1868.  
Delfín oscuro. Delfín de Fitz Roy.  
Distr.: Océano Atlántico hasta Mar del Plata.
80. *Phocaena dioptrica*. Lahille, 1912.  
Marsopa de dos colores. Marsopa de anteojos.  
Distr.: Hallada en el Río de la Plata. (Quilmes 1912; Río Santiago).
81. *Phocaena spinipinnis*. Burmeister, 1865.  
Marsopa. Marsopa espinosa.  
Distr.: Hallada frente a la desembocadura del Río de la Plata.
82. *Globicephalus melas*. (Traill, 1809).  
Calderón.  
Distr.: Costa atlántica (Mar del Plata).
83. *Pseudorca crassidens*. (Owen, 1846).  
Falsa orca.  
Distr.: Esporádicamente en la costa atlántica (bahía de Samborombón;  
Mar del Plata 1946).

Familia ZIFIDOS (*Ziphiidae*).

84. *Tursiops geophyreus*. Lahille, 1908.  
Tursión.  
Distr.: Hallado únicamente en el Río de la Plata (Quilmes 1904, Punta  
Lara 1907).

85. *Tursiops truncatus*. (Montagu, 1821).  
Tursión común.  
Distr.: Océano Atlántico, penetrando en el Río de la Plata (Punta Blanca 1951).
86. *Ziphius cavirostris*. Cuvier, 1823.  
Zifio común.  
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica (Mar del Plata).
87. *Berardius arnouxii*. Duvernoy, 1851.  
Ballena marsopa.  
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica, habiéndose hallado en el Río de la Plata (desembocadura del arroyo El Pescado 1918).
88. *Hyperoodon planifrons*. Flower, 1882.  
Gran calderón.  
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica.

Suborden MISTACOCETOS (*Mystacoceti*).  
Familia BALENOPTERIDOS (*Balaenopteridae*).

89. *Balaenoptera musculus*. (L., 1758).  
Ballena azul. Rorcual, Rorcual gigante.  
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica y del Río de la Plata (Miramar 1897; San Fernando).
90. *Balaenoptera physalus*. (L., 1758).  
Rorcual. Rorcual común.  
Distr.: Costa atlántica. Accidentalmente penetra en el Río de la Plata (San Fernando; Puerto de La Plata 1933).
91. *Balaenoptera acutorostrata*. Lacepede, 1803.  
Rorcual menor. Ballena enana.  
Distr.: Costa atlántica. Penetra en el Río de la Plata (hallazgos en Belgrano 1867; Puerto Buenos Aires 1907; Rivadavia 1917).
92. *Balaenoptera borealis*. Lesson, 1828.  
Rorcual de Rudolphi.  
Distr.: Ocasionalmente en la costa atlántica (hallazgo en Tres Arroyos).
93. *Megaptera nodosa*. Bonnaterre, 1789.  
Ballena jorobada. Gubarta. Yubarta.  
Distr.: Ocasionalmente en la costa atlántica (hallazgo en Punta del Indio).

Familia BALLEPIDOS (*Balaenidae*).

94. *Neobalaena marginata*. Gray, 1846.  
Ballena pigmea.  
Distr.: Accidentalmente en la costa atlántica.

ESPECIES EXOTICAS NATURALIZADAS

Orden ROEDORES (*Rodentia*).

Suborden MIOMORFOS (*Myomorpha*).

Familia MURIDOS (*Muridae*).

95. *Rattus norvegicus norvegicus*. (Berkenhout, 1769).  
Rata noruega. Rata. Considerada plaga.
96. *Rattus rattus rattus*. (L., 1758).  
Rata negra. Rata. Considerada plaga.
97. *Rattus rattus alexandrinus*. (E. Geoffroy, 1803).  
Rata alejandrina. Rata parda. Rata. Considerada plaga
98. *Mus musculus musculus*. (L., 1758).  
Ratón. Ratón minero. Laucha. Considerada plaga

Orden LAGOMORFOS (*Lagomorpha*).

Familia LEPORIDOS (*Leporidae*).

99. *Lepus europaeus europaeus*. L., 1758.  
Liebre. Liebre europea. Considerada plaga.
100. *Oryctolagus cuniculus cuniculus*. (L., 1758).  
Conejo. Considerada plaga.

Orden ARTIODACTILOS (*Artiodactyla*).

Familia CERVIDOS (*Cervidae*).

101. *Axis axis*. Erxleben, 1777.  
Ciervo axis. Considerada dañina.
102. *Cervus elaphus*. L., 1766.  
Ciervo. Ciervo rojo. Considerada dañina
103. *Dama dama* (L., 1766).  
Gamo. Gamo europeo. Considerada dañina.

Familia SUIDOS (*Suidae*).

104. *Sus scrofa*. (L., 1766).  
Jabalí. Considerada dañina.
105. *Sus scrofa domestica*. Gray, 1868.  
Chancho cimarrón.

ADDENDA.

Serie PECES (*Pisces*).

Clase TELEOSTOMOS (*Teleostomi*).

Familia LORICARIDOS (*Loricariidae*).

*Plecostomus plecostomus plecostomus*. (L., 1766).

Vieja. Vieja de agua.

Distr.: Río de la Plata.

Clase AVES.

Familia LARIDOS (*Laridae*).

*Larus fuscus*. L., 1758.

Gaviota.

Distr.: San Blas (*accidental*).

Familia COLUMBIDOS (*Columbidae*).

*Columba livia domestica*, Gmelin, 1788.

Paloma.

Especie exótica asilvestrada.

## INDICE DE NOMBRES VULGARES

| PECES (en sentido amplio) |                    |                          |                    |
|---------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|
| Amarillito .....          | 105                | Castañeta .....          | 143                |
| Anchoíta de río .....     | 8                  | Chafalote .....          | 39                 |
| Anguila .....             | 135                | Chanchita .....          | 142, 143, 144, 146 |
| Anguila criolla .....     | 135                | Chucho de río .....      | 2, 3               |
| Apretador .....           | 66, 85             | Chupa chupa .....        | 96                 |
| Armado .....              | 67                 | Corvina de río .....     | 138, 139, 140      |
| Armado amarillo .....     | 69                 | Cucharita .....          | 93                 |
| Armado chanco .....       | 68, 70             | Cucharón .....           | 93                 |
| Armado común .....        | 70                 |                          |                    |
|                           |                    | Dentado .....            | 36, 37             |
| Bagarito .....            | 76                 | Dientudito .....         | 31                 |
| Bagre .....               | 61, 62, 71, 75, 80 | Dientudo .....           | 29 a 38            |
| Bagre amarillo .....      | 82                 | Dorado .....             | 28                 |
| Bagre anguila .....       | 73                 |                          |                    |
| Bagre aterciopelado ..... | 60                 | Golondrina .....         | 43                 |
| Bagre blanco .....        | 79                 | Guitarrita .....         | 97, 98, 99         |
| Bagre cantor .....        | 77                 |                          |                    |
| Bagre chanco .....        | 72                 | Hocicón .....            | 65                 |
| Bagre colorado .....      | 66                 |                          |                    |
| Bagre cruz blanca .....   | 66                 | Jahú .....               | 90                 |
| Bagre gris .....          | 77                 | Juanita .....            | 151                |
| Bagre manchado .....      | 82                 | Juncalero .....          | 134                |
| Bagre overo .....         | 82                 |                          |                    |
| Bagre plateado .....      | 87                 | Lacha .....              | 6                  |
| Bagre porteño .....       | 76                 | Lamprea de bolsa .....   | 1                  |
| Bagre rojo .....          | 66                 | Lenguado de río .....    | 153, 154, 155      |
| Bagre sapo .....          | 83, 84             | Lepidosirena .....       | 4                  |
| Bagre tosquero .....      | 85                 | Limpia vidrios .....     | 114                |
| Bagre trompudo .....      | 72, 74             | Lisa .....               | 132                |
| Bagrecito .....           | 78, 81             | Loloch .....             | 4                  |
| Bandera .....             | 58                 |                          |                    |
| Bandera argentina .....   | 1                  | Machete .....            | 39, 43             |
| Barriga de fuego .....    | 105                | Madre del agua .....     | 128                |
| Basurero .....            | 105                | Madrecita del agua ..... | 129                |
| Boga .....                | 23                 | Mal anuncio .....        | 87                 |
| Bombilla .....            | 56                 | Mandufia .....           | 5                  |
| Buchona .....             | 44                 | Manduvá .....            | 63                 |
|                           |                    | Manduví .....            | 64                 |
| Cabeza amarga .....       | 149, 151           | Manguruyú .....          | 85, 90             |
| "Camarón" .....           | 96                 | Manguruyú pará .....     | 90                 |
| Carapo .....              | 59                 | Mojarra .....            | 9 a 19, 41         |
| Carpa .....               | 156                | Mojarra de velo .....    | 44                 |
| Cascarudo .....           | 100                | Mojarra pacusa .....     | 9                  |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Moncholo .....       | 79 |
| Morena negra .....   | 57 |
| Morena pintada ..... | 59 |

|               |     |
|---------------|-----|
| Otuno .....   | 60  |
| Overito ..... | 128 |

|                             |                   |     |
|-----------------------------|-------------------|-----|
| Pacú .....                  | 53,               | 54  |
| Pacucito .....              | 53, 54,           | 55  |
| Palometa .....              | 47 a 51, 53 a 55, | 143 |
| Palometa negra .....        |                   | 50  |
| Patí .....                  |                   | 86  |
| Patí bastardo .....         |                   | 87  |
| Patí de aletas negras ..... |                   | 88  |
| Pavito .....                |                   | 124 |
| Pechito .....               | 42,               | 129 |
| Peine .....                 |                   | 143 |
| Pejerrey .....              |                   | 133 |
| Perca .....                 |                   | 137 |
| Perca espinuda .....        |                   | 136 |
| "Pescado" .....             |                   | 22  |
| Pez guitarra .....          |                   | 99  |
| Pico de pato .....          |                   | 93  |
| Pique .....                 |                   | 95  |
| Pirá-guirá .....            |                   | 43  |
| Pirafña .....               | 48,               | 49  |
| Pirapitá .....              |                   | 40  |
| Portefito .....             |                   | 76  |

|                   |      |
|-------------------|------|
| Ratona .....      | 58   |
| Raya de río ..... | 2, 3 |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Sábalo .....            | 22       |
| Sabalito .....          | 26       |
| Sabalito plateado ..... | 27       |
| Salmón del Paraná ..... | 40       |
| San Pedro .....         | 147, 148 |
| Sardina .....           | 5, 8     |
| Sardina de río .....    | 7        |
| Señorita .....          | 56, 58   |
| Surubí .....            | 91       |
| Surubí atigrado .....   | 92       |
| Surubí rayado .....     | 92       |

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Tachuela .....         | 102 a 105 |
| Taralilla .....        | 46        |
| Tararira .....         | 46        |
| Tarucha .....          | 46        |
| Tritolo .....          | 24        |
| Trucha arco iris ..... | 157       |
| Trucha criolla .....   | 137       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Vieja .....         | 106 a 112, 118 a 122 |
| Vieja de agua ..... | 107 a 111, 118 a 121 |

|                        |      |     |
|------------------------|------|-----|
| Vieja de cola .....    | 122, | 123 |
| Vieja de látigo .....  |      | 123 |
| Vieja de manitos ..... |      | 113 |

## BATRACIOS

|                             |             |    |
|-----------------------------|-------------|----|
| Escuerzo .....              | 21          |    |
| Escuerzo chico .....        | 22          |    |
| Rana .....                  | 10, 11, 12, | 13 |
| Rana común .....            | 11,         | 12 |
| Rana criolla .....          | 11,         | 12 |
| Ranita de zarzal .....      | 4, 5, 6, 7, | 8  |
| Sapo .....                  |             | 2  |
| Sapo común .....            |             | 2  |
| Sapito enano .....          |             | 24 |
| Sapito panza amarilla ..... |             | 3  |
| Tapalcuá .....              |             | 1  |

## REPTILES

|                             |             |    |
|-----------------------------|-------------|----|
| Amberé .....                | 16          |    |
| Caimán .....                | 48          |    |
| Crótalo .....               | 47          |    |
| Culebra .....               | 36          |    |
| Culebra acuática .....      | 27,         | 28 |
| Culebra fiata .....         |             | 34 |
| Falsa coral .....           | 35,         | 36 |
| Falsa yarará .....          | 34,         | 38 |
| "Iguana" .....              |             | 18 |
| "Iguana" colorada .....     |             | 17 |
| "Iguana" overa .....        |             | 18 |
| Lagartija .....             | 8, 12 a 15, | 20 |
| Lagartija negra .....       |             | 19 |
| Lagarto colorado .....      |             | 17 |
| Lagarto overo .....         |             | 18 |
| Lagarto verde .....         |             | 21 |
| Laúd .....                  |             | 1  |
| Madre de las hormigas ..... |             | 23 |
| Mbói-chumbé-guazú .....     |             | 43 |
| Mbói-hovih .....            | 39,         | 41 |
| Mbói-pé-mi .....            |             | 38 |
| Mbói-pepé .....             |             | 25 |
| Nandurí .....               | 30,         | 31 |
| Parapintos .....            |             | 29 |
| Tedyú-chi .....             |             | 16 |
| Teyuguazú .....             |             | 18 |
| Teyú-hoby .....             |             | 21 |
| Teyú-i .....                |             | 21 |
| Tortuga comestible .....    |             | 5  |
| Tortuga de arroyo .....     |             | 7  |
| Tortuga de mar .....        | 4,          | 5  |
| Tortuga de río .....        | 2,          | 6  |
| Tortuga de tierra .....     |             | 3  |
| Tortuga franca .....        |             | 4  |
| Tortuga laúd .....          |             | 1  |
| Víbora de cascabel .....    |             | 47 |
| Víbora de coral .....       |             | 43 |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Víbora de cristal .....     | 25     |
| Víbora de dos cabezas ..... | 22, 23 |
| Víbora de la cruz .....     | 44     |
| Víbora fiata .....          | 34     |
| Yacaré .....                | 48     |
| Yarará .....                | 44     |
| Yarará chica .....          | 46     |
| Yarará fiata .....          | 45     |

**AVES**

|   |               |
|---|---------------|
| Acahé .....                             | 312           |
| Afrechero .....                         | 297           |
| Agachona .....                          | 124, 146, 158 |
| Aguapeazó .....                         | 123           |
| Aguatero .....                          | 124           |
| Aguila blanca .....                     | 84, 85        |
| Aguila cabeza blanca .....              | 84            |
| Aguila colorada .....                   | 82            |
| Aguila coronada .....                   | 91            |
| Aguila de cola blanca .....             | 83            |
| Aguila de la flecha .....               | 91            |
| Aguila gris .....                       | 87            |
| Aguila langostera .....                 | 88            |
| Aguila negra .....                      | 90            |
| Aguila pescadora .....                  | 90            |
| Albatros .....                          | 12, 15        |
| Albatros de cejas negras .....          | 16            |
| Albatros de pico amarillo y negro ..... | 13            |
| Albatros real .....                     | 14            |
| Alferez .....                           | 339           |
| Alma de gato .....                      | 190           |
| Amarillito .....                        | 275, 329      |
| Anambé común .....                      | 257           |
| Angelito .....                          | 130           |
| Animita .....                           | 261           |
| Anumbí rojo de Azara .....              | 246           |
| Añapero .....                           | 202           |
| Añumbí .....                            | 250           |
| Ara-guirá .....                         | 382           |
| Arañero .....                           | 231           |
| Arenero .....                           | 129           |
| Ataja caminos .....                     | 206           |
| Atí .....                               | 168           |
| Aurora .....                            | 261           |
| "Avestruz" .....                        | 1             |
| Avutarda .....                          | 55, 56        |
| Avutarda colorada .....                 | 58            |
| Avutarda de cabeza gris .....           | 57            |
| Azulejo .....                           | 356, 364      |
| Azulejo chico .....                     | 364           |
| Bandurria .....                         | 46, 47, 49    |
| Bandurria de verano .....               | 46            |
| Bandurria de invierno .....             | 47            |
| Bandurria mora .....                    | 45            |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Bandurrita común .....          | 238      |
| Eatara .....                    | 255      |
| Batitú .....                    | 134      |
| Batuirá .....                   | 131      |
| Becasa .....                    | 137      |
| Bacasa grande .....             | 147      |
| Becasina .....                  | 146      |
| Becasina de mar .....           | 137      |
| Becasina del sur .....          | 145      |
| Becasina migratoria .....       | 144      |
| Benteveo .....                  | 281      |
| Benteveo chico .....            | 280      |
| Benteveo real .....             | 278      |
| Bichofoe .....                  | 281      |
| Bicho overo .....               | 280      |
| Bienteveo .....                 | 281      |
| Biguá .....                     | 31       |
| Biguá blanco .....              | 32       |
| Biguá de vientre blanco .....   | 32       |
| Blandengue .....                | 341      |
| Boyero .....                    | 333      |
| Boyero de alas amarillas .....  | 332      |
| Bramador .....                  | 41       |
| Brasita de fuego .....          | 382      |
| Bruja .....                     | 38       |
| Buen cantor .....               | 326      |
| Buho .....                      | 196      |
| Buho chico .....                | 195      |
| Buho chuchumeco .....           | 199      |
| Buho orejudo .....              | 199      |
| Burlisto ceniciento .....       | 282      |
| Burlisto de pico crema .....    | 282      |
| Burlisto irré .....             | 283      |
| Burrito .....                   | 113, 114 |
| Burrito de patas rojas .....    | 113      |
| Burrito silbón .....            | 114      |
| Cabecita negra .....            | 373, 374 |
| Cabecita negra del oeste .....  | 373      |
| Caburé .....                    | 197      |
| Cacuí .....                     | 201      |
| Cachila .....                   | 322      |
| Cachirla .....                  | 322      |
| Cachirla chica .....            | 325      |
| Cachirla cimarrona .....        | 324      |
| Cachirla de uña corta .....     | 323      |
| Cachirla enana .....            | 325      |
| Cachirrito .....                | 383      |
| Cachudita .....                 | 291      |
| Cachudita pico amarillo .....   | 290      |
| Caiquén .....                   | 55, 56   |
| Calancate .....                 | 182      |
| Ca andria .....                 | 317      |
| Calandria común .....           | 317      |
| Calandria chica .....           | 316      |
| Calandria de la Patagonia ..... | 316      |
| Calandria de la sierra .....    | 316      |

|                                    |          |                                     |               |
|------------------------------------|----------|-------------------------------------|---------------|
| Calandria de tres colas .....      | 318      | Chorlo agachón .....                | 158           |
| Calandria real .....               | 318      | Chorlo boreal .....                 | 140           |
| Caminera .....                     | 225      | Chorlo cabezón .....                | 132           |
| Canasterito .....                  | 242      | Chorlo canela .....                 | 133           |
| Canastero .....                    | 241, 243 | Chorlo de Hudson .....              | 136           |
| Canastero argentino .....          | 240      | Chorlo de invierno .....            | 133           |
| Canastero coludo .....             | 245      | Chorlo de pico corvo .....          | 135           |
| Canastero patagónico .....         | 244      | Chorlo dorado .....                 | 128           |
| Capitá .....                       | 363      | Chorlo garganta blanca acanelada .. | 154           |
| Caracara .....                     | 98       | Chorlo grande de patas amarillas .. | 139           |
| Caracolero .....                   | 81       | Chorlo grande de pico corvo .....   | 136           |
| Carachilla .....                   | 151      | Chorlo gris .....                   | 127           |
| Carancho .....                     | 98       | Chorlo manchado .....               | 143           |
| Carau .....                        | 104      | Chorlo menor de patas amarillas ..  | 138           |
| Cardenal .....                     | 362      | Chorlo pampa .....                  | 128           |
| Cardenal amarillo .....            | 361      | Chorlo playero de la Patagonia ..   | 130           |
| Cardenal azul .....                | 353      | Chorlo rojizo .....                 | 148           |
| Cardenal sin copete .....          | 363      | Chorlo semipalmado .....            | 131           |
| Carnerito .....                    | 300      | Chorlote .....                      | 252           |
| Carnero del Cabo .....             | 18       | Chotoy .....                        | 233           |
| Carpintero blanco .....            | 219      | Chuchumenta .....                   | 252           |
| Carpintero campestre .....         | 218      | Chumulucuco .....                   | 206           |
| Carpintero chorreado .....         | 222      | Churí .....                         | 279           |
| Carpintero de gorro rojo .....     | 220      | Churrinche .....                    | 274           |
| Carpintero negro de lomo blanco .. | 221      | Cigarra .....                       | 381           |
| Caserito .....                     | 226      | Cigüeña .....                       | 43            |
| Casero .....                       | 226      | Cigüeña de cabeza pelada .....      | 42            |
| Casero .....                       | 251, 252 | Cisne .....                         | 54            |
| Cata común .....                   | 184      | Cisne blanco .....                  | 54            |
| Cauquén .....                      | 55, 56   | Cisne de cuello negro .....         | 53            |
| Cazamoscas .....                   | 268      | Cocha polla .....                   | 106, 116      |
| Ceniciento .....                   | 189, 298 | Cola aguda .....                    | 241           |
| Chajá .....                        | 52       | Col-col .....                       | 188           |
| Chalchalero .....                  | 319      | Coludito copetón .....              | 232           |
| Charlatán .....                    | 348      | Coludo .....                        | 240, 243, 245 |
| Charrúa .....                      | 342      | Coludo enano .....                  | 242           |
| Chicli .....                       | 236      | Come sebo chico .....               | 378           |
| Chiflón .....                      | 37       | Contramaestre .....                 | 327           |
| Chimachima .....                   | 96       | Copetón .....                       | 299           |
| Chimango .....                     | 96       | Corbatita común .....               | 365           |
| Chincheró grande .....             | 224      | Corbatita del Paraguay .....        | 366           |
| Chingolo .....                     | 384      | Corbatita dominó .....              | 366           |
| Chiricote .....                    | 109      | Corbatita gris .....                | 371           |
| Chivi-chivi .....                  | 327, 387 | Corbatita paraguayito .....         | 367           |
| Choca menor .....                  | 255      | Corbatita patativa .....            | 369           |
| Chochí .....                       | 193      | Corbatita rojiza .....              | 370           |
| Choliba .....                      | 195      | Corbatita semillera .....           | 363           |
| Chopí .....                        | 342      | Coronada .....                      | 330           |
| Chorlito blanco .....              | 149      | Corta ramas .....                   | 300           |
| Chorlito de collar .....           | 129      | Correcaminos .....                  | 225           |
| Chorlito de lomo negro .....       | 152      | Cotorrita de Buenos Aires .....     | 184           |
| Chorlito de manchas acaneladas ..  | 141      | Crespín .....                       | 193           |
| Chorlito de mar .....              | 156      | Crispín .....                       | 193           |
| Chorlito de tres colores .....     | 157      | Cuaco .....                         | 38            |
| Chorlito palmeado .....            | 153      | Cuclillo de ojo colorado .....      | 189           |
| Chorlito rabadilla blanca .....    | 151      | Cuclillo de pico amarillo .....     | 187           |
| Chorlito solitario .....           | 142      | Cuclillo de pico negro .....        | 188           |

|   |                   |  |          |
|---|-------------------|--|----------|
| Cucuruca .....                            | 315               | Gallineta rojiza .....                           | 109      |
| Cuervillo de cañada .....                 | 49                | Gallinetita .....                                | 118, 114 |
| Cuervillo de cara pelada .....            | 48                | Gallinetita de pintas blancas .....              | 115      |
| Cuervo de cañada .....                    | 49                | Gallinetita enana .....                          | 115      |
| Cuervo negro .....                        | 76                | Gallito de agua .....                            | 123, 266 |
| Curutíe .....                             | 237               | Gallito de las rocas .....                       | 266      |
| Damero del cabo .....                     | 18                | Ganso blanco .....                               | 54       |
| Diuca chica .....                         | 377               | Garcita .....                                    | 34       |
| Diucón rojizo .....                       | 265               | Garcita azulada .....                            | 34       |
| Domador .....                             | 276               | Garcita mirasol .....                            | 40       |
| Dominó .....                              | 366               | Garganta amarilla .....                          | 239      |
| Dorado .....                              | 375               | Gargantilla .....                                | 365      |
| Dorado copetón .....                      | 287               | Garza blanca .....                               | 35       |
| Dormilón .....                            | 38, 203, 204, 207 | Garza blanca grande .....                        | 35       |
| Dormilón de cola larga .....              | 206               | Garza colorada .....                             | 39       |
| Dormilona .....                           | 158               | Garza mora .....                                 | 33       |
| Dragón .....                              | 344               | Gaucho .....                                     | 259      |
| Escarchero .....                          | 266               | Gaviero .....                                    | 327      |
| Espátula .....                            | 50                | Gavilán aplomado .....                           | 94       |
| Espátula rosada .....                     | 50                | Gavilán ceniciento .....                         | 92       |
| Espinerito .....                          | 248               | Gavilán de alas largas .....                     | 93       |
| Esp'nero .....                            | 249, 250          | Gavilán de garganta negra .....                  | 86       |
| Espinero de frente roja .....             | 247               | Gavilán mixto común .....                        | 89       |
| Espinero grande .....                     | 246               | Gavilán oscuro y canela .....                    | 89       |
| Federal .....                             | 341               | Gavilán plumizo .....                            | 94       |
| Fío fío .....                             | 296               | Gavilán semicollarado .....                      | 95       |
| Fío fío afrechero .....                   | 287               | Gaviota ártica .....                             | 172      |
| Fío fío mediano .....                     | 298               | Gaviota cabeza parda .....                       | 167      |
| Fío fío vocinglero .....                  | 298               | Gaviota capucho café .....                       | 167      |
| Flamenco .....                            | 51                | Gaviota capucho gris .....                       | 165      |
| Frigilo negro .....                       | 379               | Gaviota cocinera .....                           | 166      |
| Fruterito de la liga .....                | 349               | Gaviota cocinera de cola blanca y negra .....    | 164      |
| Frutero .....                             | 354, 358          | Gaviota de cabeza gris .....                     | 165      |
| Frutero azulejo del litoral .....         | 356               | Gaviota de cola larga .....                      | 162      |
| Fueguero .....                            | 357               | Gaviota de rapaña .....                          | 163      |
| Gallareta .....                           | 120, 121, 122     | Gaviotín .....                                   | 168      |
| Gallareta de alas blancas .....           | 121               | Gaviotín chico .....                             | 173      |
| Gallareta de ligas rojas .....            | 120               | Gaviotín de caperuza y nuca blancas .....        | 174      |
| Gallareta de pico rojo .....              | 122               | Gaviotín de ceja blanca .....                    | 173      |
| Gallineta .....                           | 107               | Gaviotín de patas y pico negros .....            | 169      |
| Gallineta antártica .....                 | 105               | Gaviotín mayor de pico anaranjado .....          | 175      |
| Gallineta azul .....                      | 119               | Gaviotín real .....                              | 175      |
| Gallineta cara negra .....                | 117               | Gaviotón .....                                   | 166      |
| Gallineta con casco .....                 | 118               | Golondrina ártica .....                          | 172      |
| Gallineta de agua .....                   | 110               | Golondrina azul .....                            | 307      |
| Gallineta de los alfalfares .....         | 111               | Golondrina azul doméstica .....                  | 301      |
| Gallineta de pico largo .....             | 107               | Golondrina blanca .....                          | 309      |
| Gallineta de pico rojo .....              | 105               | Golondrina chica .....                           | 306      |
| Gallineta enana .....                     | 111               | Golondrina de cara castaña .....                 | 306      |
| Gallineta enana de vientre amarillo ..... | 112               | Golondrina de garganta leonada .....             | 305      |
| Gallineta overa .....                     | 108               | Golondrina de los campos .....                   | 305, 311 |
| Gallineta pico rojo .....                 | 116               | Golondrina de los hornos .....                   | 303      |
|   |                   | Golondrina de mar .....                          | 170      |
|   |                   | Golondrina de mar de pico y dedos bermejos ..... | 171      |
|   |                   | Golondrina de rabadilla parda .....              | 304      |

|                                   |          |                                   |               |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---------------|
| Golondrina doméstica .....        | 301      | Loica .....                       | 347           |
| Golondrina negra doméstica .....  | 302      | Loica argentina .....             | 345           |
| Golondrina rabadilla blanca ..... | 310      | Loro barranquero .....            | 183           |
| Golondrina tijereta .....         | 308      | Loro de cabeza roja .....         | 186           |
| Gorrión .....                     | 331      | Loro de Castilla .....            | 185           |
| Guacara .....                     | 284      | Loro de los palos .....           | 182           |
| Guira-hu .....                    | 342      | Loro hablador .....               | 185           |
| Guirahuró .....                   | 343      | Loro real .....                   | 185           |
|                                   |          | Loyca .....                       | 347           |
| Había ceniciento .....            | 360      |                                   |               |
| Habiero .....                     | 360      | Macá .....                        | 10            |
| Habrura .....                     | 283      | Macá blanco .....                 | 9             |
| Halcón azulado .....              | 80, 100  | Macá grande .....                 | 11            |
| Halcón blanco .....               | 78       | Macá mediano .....                | 10            |
| Halcón canela .....               | 103      | Macá plateado .....               | 9             |
| Halcón caracolero .....           | 81       | Macacito .....                    | 8             |
| Halcón cola tijera .....          | 79       | Mandioca .....                    | 319           |
| Halcón peregrino .....            | 101      | Manimbé .....                     | 383           |
| Halcón peregrino del Norte .....  | 101      | Margarita .....                   | 276           |
| Halcón tijereta .....             | 79       | Martín chico .....                | 217           |
| Halcón viajero .....              | 101      | Martín pescador chico .....       | 217           |
| Halcón viajero del Sur .....      | 102      | Martín pescador grande .....      | 215           |
| Halconcito .....                  | 99, 103  | Martín pescador grande del Sur .. | 214           |
| Halconcito colorado .....         | 103      | Martín pescador mediano .....     | 216           |
| Halconcito gris .....             | 99       | Martineta .....                   | 5             |
| Hocó .....                        | 39, 41   | "Martineta" colorada .....        | 4             |
| Hocó jasjeado .....               | 39       | Martineta copetona .....          | 5             |
| Hornero .....                     | 226      | Matadura .....                    | 276           |
| Huequero .....                    | 278, 280 | Matraca .....                     | 215           |
|                                   |          | Mbiguá .....                      | 31            |
| Irré .....                        | 283      | Meneacola .....                   | 227           |
| Irupero .....                     | 263      | Mero común .....                  | 258           |
|                                   |          | Mero cordillerano del Sur .....   | 259           |
| Jabirú .....                      | 44       | Miente mi tío .....               | 386           |
| Jacana .....                      | 123      | Mirasol .....                     | 36, 40        |
| Jilguero .....                    | 375      | Mirasol grande .....              | 36            |
| Jote .....                        | 76, 77   | Misto .....                       | 376           |
| Juan Chiviro .....                | 326      | Misto cimarrón .....              | 376           |
| Juan Chiviro común .....          | 359      | Monjita .....                     | 184, 263, 264 |
| Juan Chiviro de las pajas .....   | 391      | Monjita blanca .....              | 263           |
| Juan Chiviro pico grueso .....    | 360      | Monjita coronada .....            | 261           |
| Juan soldado .....                | 341      | Monjita dominica .....            | 262           |
| Junquero .....                    | 230      | Monjita escarchera .....          | 260           |
|                                   |          | Monjita negra .....               | 262           |
| Ladrón de pollos .....            | 92       | Monjita rojiza .....              | 265           |
| Lechucita de las cuevas .....     | 198      | Monterita .....                   | 385           |
| Lechuza de campo .....            | 198      | Mosqueta .....                    | 285           |
| Lechuza de las vizcacheras .....  | 198      | Mulata .....                      | 334           |
| Lechuzón .....                    | 200      | Músico .....                      | 334           |
| Lechuzón de campo .....           | 200      |                                   |               |
| Lechuzón de iglesia .....         | 194      | Naranjerito de la liga .....      | 349           |
| Lechuzón de los campanarios ..... | 194      | Naranjero .....                   | 354           |
| Lechuzón de los pajonales .....   | 200      | Ñacundá .....                     | 203           |
| Leñatero .....                    | 249, 250 | Ñacurutú .....                    | 196           |
| Lindo azul cabeza blanca .....    | 353      | Ñacurutucito .....                | 195           |
|                                   |          | Ñandú .....                       | 1             |

|  |        |   |          |
|--|--------|---|----------|
| Oscurito .....                               | 293    | Pepoazá .....                                   | 263      |
| Ostrero .....                                | 125    | Perdiz .....                                    | 3        |
| Ovejero .....                                | 276    | Perdiz chica .....                              | 3        |
|  |        | Perdiz chica de Patagonia .....                 | 2        |
| Pájaro bobo .....                            | 7, 268 | Perdiz colorada .....                           | 4        |
| Pájaro niño .....                            | 7      | Petrel .....                                    | 22       |
| Pajera pico curvo .....                      | 229    | Petrel azulado .....                            | 21       |
| Paleta .....                                 | 339    | Petrel común .....                              | 18       |
| Paloma ala colorada común .....              | 181    | Petrel de las tormentas .....                   | 28       |
| Paloma antártica .....                       | 159    | Petrel de las tormentas de cara<br>blanca ..... | 28       |
| Paloma de monte .....                        | 181    | Petrel de Wilson .....                          | 28       |
| Paloma de monte de alas man-<br>chadas ..... | 177    | Petrel del Atlántico Norte .....                | 27       |
| Paloma grande de alas manchadas              | 177    | Petrel gigante .....                            | 17       |
| Paloma montaráz .....                        | 181    | Petrel grande .....                             | 20       |
| Paloma torcaz .....                          | 179    | Petrel gris .....                               | 24       |
| Paloma torcaz común .....                    | 179    | Petrel gris plateado .....                      | 19       |
| Paloma turca .....                           | 178    | Petrel negro de barba blanca .....              | 23       |
| Palomita .....                               | 180    | Petrel oscuro de pico largo .....               | 26       |
| Pampita .....                                | 273    | Petrel pardo y blanco .....                     | 25       |
| Papa hormigas .....                          | 284    | Petrel zambullidor de las Malvinas              | 30       |
| Papa piri .....                              | 289    | Picaflor azul de garganta blanca ..             | 202      |
| Paraguayito .....                            | 367    | Picaflor azul de garganta roja .....            | 210      |
| Patativa .....                               | 369    | Picaflor bronceado .....                        | 208      |
| Pato argentino .....                         | 67     | Picaflor de corona rojo anaranjada              | 212      |
| Pato barcino chico .....                     | 64     | Picaflor de garganta rojiza .....               | 213      |
| Pato barcino grande .....                    | 69     | Picaflor verde común .....                      | 211      |
| Pato cabeza negra .....                      | 72     | Picabuey .....                                  | 276      |
| Pato cara blanca .....                       | 68     | Picazuro .....                                  | 178      |
| Pato colorado .....                          | 66     | Pico de estuche .....                           | 159      |
| Pato crestudo .....                          | 62     | Pico de plata .....                             | 272      |
| Pato criollo .....                           | 61     | Pico ronzón azul y canela .....                 | 350      |
| Pato crestón .....                           | 73     | Pico tijeras .....                              | 176      |
| Pato cuchara .....                           | 71     | Picu-f .....                                    | 180      |
| Pato de ceja blanca .....                    | 65     | Pijuf .....                                     | 234, 236 |
| Pato de collar .....                         | 65     | Pijuf común .....                               | 235      |
| Pato dominico .....                          | 74     | Pinchiraca .....                                | 192      |
| Pato fierro .....                            | 74     | Pingüín .....                                   | 7        |
| Pato franciscano .....                       | 64     | Pingüín de penacho amarillo .....               | 6        |
| Pato gargantilla .....                       | 68     | Pingüino .....                                  | 7        |
| Pato maicero .....                           | 69     | Piojito .....                                   | 294      |
| Pato negro .....                             | 72     | Piojito amarillo .....                          | 286      |
| Pato overo .....                             | 70     | Piojito azulado .....                           | 321      |
| Pato picazo .....                            | 70, 73 | Piojito de las riberas .....                    | 293      |
| Fato pico cuchara .....                      | 71     | Piojito gris .....                              | 293      |
| Pato portugués .....                         | 63     | Pirincho .....                                  | 192      |
| Pato silbón común .....                      | 60     | Pirincho negro grande .....                     | 191      |
| Pato viuda .....                             | 59     | Pitiayumi .....                                 | 328      |
| Pato zambullidor común .....                 | 75     | Pito Juan .....                                 | 281      |
| Pecho amarillo .....                         | 344    | Pola pula .....                                 | 330      |
| Pecho amarillo guirá-huro .....              | 343    | Polla de agua .....                             | 106, 108 |
| Pecho colorado chico .....                   | 345    | Polla de agua común .....                       | 118      |
| Pecho colorado grande .....                  | 347    | Pollito de mar .....                            | 150      |
| Pecho colorado mediano .....                 | 346    | Pollona .....                                   | 118      |
| Pepitero .....                               | 359    | Pollona azul .....                              | 119      |
| Pepitero común .....                         | 359    | Punera .....                                    | 241      |



|                                 |        |  |        |
|---------------------------------|--------|--|--------|
| Ballena enana .....             | 91     | Gran calderón .....                        | 88     |
| Ballena jorobada .....          | 93     | Guanaco .....                              | 73     |
| Ballena marsopa .....           | 87     | Guazuncho .....                            | 74     |
| Ballena pigmea .....            | 94     | Guazú-pucú .....                           | 74     |
| Bolita .....                    | 69     | Guazú-tí .....                             | 75     |
|                                 |        | Gubarta .....                              | 93     |
| Calderón .....                  | 82     |  |        |
| Capibara .....                  | 67     | Hocicudo .....                             | 44, 45 |
| Carpincho .....                 | 67     | Huanaco .....                              | 73     |
| Ciervo .....                    | 102    | Hurón menor .....                          | 17     |
| Ciervo axis .....               | 101    | Huroncito .....                            | 18     |
| Ciervo de la pampa .....        | 75     |  |        |
| Ciervo de los pantanos .....    | 74     | Jabalí .....                               | 104    |
| Ciervo del Delta .....          | 74     | "Jaguar" .....                             | 26     |
| Coipo .....                     | 62     |  |        |
| Coipú .....                     | 62     | Laucha .....                               | 43, 98 |
| Coligrueso .....                | 2      | Laucha de Azara .....                      | 42     |
| Colilargo .....                 | 31     | Laucha de campo mediana .....              | 39     |
| Colilargo del Plata .....       | 30     | Laucha manchada .....                      | 41, 42 |
| Comadreja colorada .....        | 2      | "León" .....                               | 25     |
| Comadreja overa .....           | 1      | Liebre .....                               | 99     |
| Comadreja picaza .....          | 1      | Liebre europea .....                       | 99     |
| Conejo .....                    | 100    | Liebre patagónica .....                    | 66     |
| Cuis .....                      | 63, 65 | Lobito de río .....                        | 22     |
| Cuis chico .....                | 64     | Lobito del Plata .....                     | 21     |
| Cuis chico de las pampas .....  | 64     | Lobo cangrejero .....                      | 28     |
| Cuis de dientes amarillos ..... | 63     | Lobo de un pelo .....                      | 27     |
| Cuis de la pampa .....          | 65     | Lobo marino .....                          | 27     |
|                                 |        | Lobo marino de un pelo .....               | 27     |
| Delfín azul .....               | 77     |  |        |
| Delfín de Fitz Roy .....        | 79     | Mara .....                                 | 66     |
| Delfín de pico largo .....      | 78     | Marra .....                                | 66     |
| Delfín del Plata .....          | 76     | Mataco .....                               | 69     |
| Delfín obscuro .....            | 79     | Marsopa .....                              | 81     |
|                                 |        | Marsopa de anteojos .....                  | 80     |
| Elefante marino .....           | 29     | Marsopa de dos colores .....               | 80     |
| Elefante marino del Sur .....   | 29     | Marsopa espinosa .....                     | 81     |
| "Eligmodonte" .....             | 34     | Mbicuré .....                              | 1      |
|                                 |        | Mbicuré-hú .....                           | 1      |
| Falsa nutria .....              | 62     | Mbicuré-pitá .....                         | 2      |
| Falsa orca .....                | 83     | Micuré .....                               | 1      |
| Falso vampiro flor de lis ..... | 6      | Minuania argentina .....                   | 3      |
| Foca blanca .....               | 28     | Mulita .....                               | 72     |
| Foca cangrejera .....           | 28     | Mulita chica .....                         | 72     |
| Franciscana .....               | 76     | Murciélago boreal rojizo .....             | 10     |
|                                 |        | Murciélago cola de ratón .....             | 13     |
| Gamo .....                      | 103    | Murciélago colorado .....                  | 10     |
| Gamo europeo .....              | 103    | Murciélago chico de vientre blanco .....   | 7      |
| Gato de las pajas .....         | 23     | Murciélago leonado .....                   | 12     |
| Gato de pajonal .....           | 23     | Murciélago oreja de ratón .....            | 8      |
| Gato montés .....               | 24     | Murciélago orejón .....                    | 9      |
| Gato pajero .....               | 23     | Murciélago orejudo .....                   | 9      |
|                                 |        | Murciélago pardo blanquizco de Azara ..... | 11     |

|                                   |            |                                  |                    |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| "Nutria" .....                    | 62         | Rorcual de Rudolphi .....        | 92                 |
| Nutria roedora .....              | 62         | Rorcual gigante .....            | 89                 |
| Oculto .....                      | 59, 60, 61 | Rorcual menor .....              | 91                 |
| Orejón .....                      | 46, 47, 48 | Quirquincho bola .....           | 69                 |
| Peludo .....                      | 70         | Quirquincho peludo .....         | 70                 |
| Pequeño moloso de Buenos Aires .. | 14         | Quiyá .....                      | 62                 |
| Pericote de nalga amarilla .....  | 32         | Tatú mulita .....                | 72                 |
| Piche .....                       | 71         | "Tigre" americano .....          | 26                 |
| Piche de orejas cortas .....      | 71         | Tuco .....                       | 57, 58, 59, 60, 61 |
| Pichiciego .....                  | 68         | Tuco de los talas .....          | 57                 |
| Pichiciego menor .....            | 68         | Tuco tuco de los talas .....     | 57                 |
| Puma .....                        | 25         | Tucu-tuco .....                  | 57, 58, 60, 61     |
| Rata .....                        | 95, 96, 97 | Tucu-tuco acanelado .....        | 59                 |
| Rata acuática .....               | 52, 53     | Tucu-tuco de los talas .....     | 57                 |
| Rata acuática grande .....        | 51         | Tursión .....                    | 84                 |
| Rata alejandrina .....            | 97         | Tursión común .....              | 85                 |
| Rata amarillenta grande .....     | 33         | Vampiro atrapa moscas .....      | 5                  |
| Rata de agua .....                | 49         | Venado .....                     | 75                 |
| Rata de bañado .....              | 50         | Vizcacha .....                   | 55, 56             |
| Rata negra .....                  | 96         | Vizcacha de la pampa .....       | 55, 56             |
| Rata noruega .....                | 95         | Yaguar .....                     | 26                 |
| Rata parda .....                  | 97         | Yaguareté .....                  | 26                 |
| Ratón .....                       | 98         | Yubarta .....                    | 93                 |
| Ratón conejo .....                | 48         | Zifio común .....                | 86                 |
| Ratón conejo de las pampas .. 46, | 47         | Zorrillo .....                   | 20, 21             |
| Ratón de agua .....               | 48         | Zorrinito .....                  | 19                 |
| Ratón de las arenas .....         | 35, 36     | Zorrino común .....              | 20, 21             |
| Ratón hocicudo .....              | 44         | Zorrino chico .....              | 19                 |
| Ratón del palo .....              | 4          | Zorro .....                      | 15, 16             |
| Ratón manchado .....              | 41, 42     | Zorro de la pampa .....          | 15                 |
| Ratón minero .....                | 98         | Zorro gris de la Patagonia ..... | 16                 |
| Ratón nutria .....                | 50         | Zorro gris común .....           | 15                 |
| Rorcual .....                     | 89, 90     |                                  |                    |
| Rorcual común .....               | 90         |                                  |                    |

Versión Electrónica

**Justina Ponte Gómez**

División Zoología Vertebrados

FCNyM

UNLP

[Jpg\\_47@yahoo.com.mx](mailto:Jpg_47@yahoo.com.mx)



DIRECCION

DE IMPRESIONES OFICIALES

DE LA

PROVINCIA DE BS AS

LA PLATA