



BIBLIOTECA

LA DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LAS RAZAS
AUSTRALES DE *ANAIRETES PARULUS* EN LA ARGENTINA
(AVES, TYRANNIDAE)

JORGE R. NAVAS* y NELLY A. BO**

El Cachudito Pico Negro, *Anairetes parulus*, comprende tres subespecies, las cuales habitan todas en el territorio argentino. Una de ellas, *A. p. aequatorialis* Berlepsch y Taczanowski, 1884, vive, en la Argentina, sólo en el extremo noroeste. El motivo del presente trabajo, es establecer con más precisión la distribución geográfica de las dos razas restantes y, además, fijar con más detalle el límite de separación entre ambas.

La primera cita de *Anairetes parulus parulus* (Kittlitz, 1830) para la Argentina se debe a Hartert y Venturi (1909: 198), quienes la dan a conocer para Ushuaia, Tierra del Fuego. Posteriormente, Peters (1923: 324) señala un ejemplar procedente de Bariloche, lago Nahuel Huapi, Río Negro, que refiere a la subespecie *patagonicus*, pero más tarde Wetmore y Peters (1924: 145) la adjudican a la raza nominotípica. Estas dos menciones son las únicas que se conocen para la Argentina hasta la fecha.

Las características que identifican la subespecie *A. p. parulus* son las siguientes: estrías del pecho muy finas; bandas alares (dos) ausentes o muy poco marcadas; abdomen de coloración amarillo. A estos caracteres responden nuestros materiales de Chile, lago Nahuel Huapi, El Bolsón, El Maitén, lago Puelo, San Martín de los Andes, Las Coloradas, Trevelin, lago Argentino y lago Fagnano.

El material de Perito Moreno, provincia de Río Negro, si bien lo incluimos en la subespecie *parulus*, muestra características intermedias con la raza *patagonicus*, con estrías del pecho menos finas y abdomen amarillo; pero con bandas alares ya marcadas. A partir de esta localidad hacia el oriente, las poblaciones muestran bien definidos los rasgos de la raza *patagonicus*.

Material examinado: (48 ejemplares): Neuquén, lago Nahuel Huapi, 1 ♀, 15 Dic 1912; San Martín de los Andes, cerro Chapelco, 2 ♂ y 1 ♀, 6 May 1963; Las Coloradas, estancia Campo Grande, 1 ♀, 12 May 1963. Río Negro, El Bolsón, 10 ♂, 7 ♀ y 1 ♀, 11 Abr, 9, 21 y 22 Jun, 15, 26, 29, 31 Jul 1960, 21 Ago 1961, 16 Abr 1962; Perito Moreno, estancia San Ramón, 4 ♂ y 2 ♀, 2

* Museo Argentino de Ciencias Naturales, Angel Gallardo 470, Buenos Aires.

** Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata, 1900, La Plata.

May 1963. Chubut, El Maitén, Puesto Burro, 1 o, 16 May 1918; Trevelin, 1 ?, 16 Mar 1945; lago Puelo, 1 o y 2 ♀, 26 Abr 1965. Santa Cruz, lago San Martín, 1 o y 1 ?, Dic 1936 y Feb 1939; lago Argentino, 1 o y 1 ♀, 14 Ene 1959. Tierra del Fuego, lago Fagnano, 1 ?, 14 Feb 1965. Chile, Linares, 1 o, 11 Jul 1945; Santiago, 2 o, Mar 1932 y May 1934; Concepción, 1 o y 1 ♀, Jun 1939; Curicó, 1 ♀, Jun 1939; Concón, 1 ♀, Jul 1938; Camarico, 1 o, Jun 1938; Quilpué, 1 o, Jul 1938.


La otra subespecie, *Anairetes parulus patagonicus* (Hellmayr, 1920), se distribuye por las provincias de Mendoza, La Pampa, este del Neuquén, centro y este de Río Negro, extremo sur de Buenos Aires hasta el este de Santa Cruz, de acuerdo a Hellmayr (1927: 372-373), Narosky (1984: 124), Olrog (1979: 226) y Traylor (1979: 48). En el otoño migra hasta Tucumán y Salta.

A esta distribución conocida se agregan además la cita de Masramón (1969: 42), criando en el valle de Conlara, San Luis; la de Nores *et al.* (1983: 72) también criando en las sierras de Córdoba, y la de Navas y Bó (1986: 257) para Lihué Calel, La Pampa, con ejemplares colectados en invierno.

Koslowsky (1895a: 280 y 1895b: 289) la señala para Chilecito, La Rioja y provincia de Catamarca, respectivamente. El material fue coleccionado durante los meses de marzo a mayo, aunque la da como monotípica, de manera que no se puede saber a qué subespecie pertenece, pero casi seguramente serían casos de migración de esta misma raza. Dicho material no se ha podido localizar en las colecciones del Museo de La Plata.

Hemos examinado asimismo algunos ejemplares procedentes de las provincias de Jujuy, Catamarca y Tucumán, que probablemente deben ser migratorios de la presente subespecie. Disponemos, además, de un ejemplar capturado en Singuil, Catamarca, en el mes de enero, lo que hace suponer que esta raza podría ser residente permanente en esa provincia, aunque un sólo espécimen no resuelve la cuestión.

Mapa de la República Argentina en el cual se señalan las localidades del material examinado 1. Neuquén, Las Coloradas, Estancia Campo Grande. 2. Neuquén, San Martín de los Andes, cerro Chapelco. 3. Neuquén, lago Nahuel Huapi. 4. Río Negro, Perito Moreno, estancia San Ramón. 5. Río Negro, El Bolsón. 6. Chubut, El Maitén, puesto Burro. 7. Chubut, lago Puelo. 8. Chubut, Trevelin. 9. Santa Cruz, lago San Martín. 10. Santa Cruz, lago Argentino. 11. Tierra del Fuego, lago Fagnano. 12. Jujuy, Tilcara. 13. Tucumán, Aconquija, 3000 m s.m.; Concepción. 14. Catamarca, Singuil, estancia El Chorro. 15. Catamarca, Depto. Andalgalá, Esquina Grande. 16. San Juan, Jáchal. 17. San Juan, Niquivil. 18. Córdoba, Pampa de Achala, El Cóndor, 2200 m s.m. 19. San Juan, Pachaco. 20. Mendoza, Potrerillos, 1700-2000 m s.m. 21. Mendoza, Alto Verde. 22. Mendoza, Depto. San Carlos, Viluco. 23. Mendoza, Malargüe. 24. La Pampa, La Asturiana. 25. Buenos Aires, Alzaga, estancia Santa Clara. 26. La Pampa, sierra de Lihué Calel. 27. Neuquén, sierra de Auca Mahuida, Ruta Provincial 36. 28. Buenos Aires, General Cerri. 29. Buenos Aires, Argerich. 30. Río Negro, Villa Regina. 31. Río Negro, Julián Romero, Valle Azul. 32. Río Negro, Cubanea, Ruta 250. 33. Buenos Aires, Carmen de Patagones. 34. Río Negro, Aguada de Guerra. 35. Río Negro, Campana Mahuida, Arroyo de la Ventana. 36. Chubut, Península Valdés.



Dib. C.R. Tremouilles

Con el nuevo material que hemos analizado ahora, agregamos la provincia de San Juan (Jáchal y Niquivil), que son las localidades más septentrionales de su área de cría, donde los machos muestran el siguiente desarrollo gonadal: 7 x 4 y 4 x 2 mm (3 de diciembre).

La subespecie *patagonicus* se caracteriza por las estrías del pecho más anchas que la nominotípica; las bandas alares bien marcadas y el abdomen amarillento pálido o blanquecino, aunque este último carácter no es de gran importancia, puesto que puede ser, en algunos casos, hasta amarillo definido.

Material examinado: (59 ejemplares): Jujuy, Tilcara, 1 ♂, 1 Ago 1914. Catamarca, Esquina Grande, Depto. Andalgalá, 2 ♀, 15-16 Jul 1950; Singuil, Ea. El Chorro, 1 ♂, 26 Ene 1953. Tucumán, Aconquija, 3000 m s.m., 1 ♂, 19 Ago 1928; Concepción, 1 ♂, 27 May 1926. San Juan, Jáchal, 1 ♂ y 1 ♀, 3 Dic 1963; Niquivil, 1 ♂ y 1 ♀, 3 Dic 1963; Pachaco, 1 ♀, Mar 1940. Córdoba, Pampa de Achala, El Cóndor, 2200 m s.m., 1 ♂ y 1 ♀, 15 Nov 1963. Mendoza, Potrerillos, 1700-2000 m s.m., 1 ♂ y 1 ♀, 25 Nov 1963; Alto Verde, 1 ♂ y 1 ♀, 24 Nov 1963; Malargüe, 2 ♂ y 2 ♀, 7 Abr 1979; Viluco, Depto. San Carlos, 1 ♂, 26 Nov 1919. La Pampa, sierra de Lihué Calel, 7 ♂ y 3 ♀, 5 Jun 1963; La Asturiana, 1 ♂ y 1 ♀, 6 Jun 1963. Buenos Aires, Alzaga, Ea. Santa Clara, 1 ♂, 11 Jul 1948; General Cerri, 1 ♂, 12 Feb 1962; Argerich, 1 ♂, 16 Abr 1963; Carmen de Patagones, 1 ♂, 18 Abr 1963. Neuquén, sierra de Auca Mahuida, ruta provincial 36, 2 ♂ y 2 ♀, 25 Oct 1981. Río Negro, Villa Regina, 1 ♀, 30 May 1963; Julián Romero, Valle Azul, 3 ♂ y 4 ♀, 22-25 May 1963; Cubanea, ruta 250, 1 ♂ y 1 ♀, 17 Feb 1962; Campana Mahuida, Arroyo de la Ventana, 3 ♂ y 2 ♀, 23-25 Abr 1963; Aguada de Guerra, 1 ♀, 5 May 1913. Chubut, península Valdés, 1 ♂, 17 Ene 1913.

SUMMARY

The geographical distribution of the southern subspecies of the Tuffed Tit-Tyrant, *Anairetes parulus* in Argentina.

This paper deals with new information about the geographical distribution of the southern races of *Anairetes parulus* in Argentina. The contact area between both subspecies is very well defined. Furthermore, the main characters of these races are presented in this paper.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- HARTERT, E. y S. VENTURI, 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. *Novit. Zool.*, 16: 159-267.
 HELLMAYR, C. E., 1927. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. *Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser.*, 13 (5): I-VII + 1-517.
 KOSLOWSKY, J., 1895a. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito (Provincia de La Rioja - República Argentina). *Rev. Mus. La Plata*, 6: 277-287.
 -- 1895b. Aves recogidas en la provincia de Catamarca (República Argentina) durante los

- meses de marzo y abril de 1895. *Rev. Mus. La Plata*, 6: 289-292.
 NAROSKY, S., 1984. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. *Hornero*, 12 (2): 122-126.
 NAVAS, J. R. y N. A., BO, 1986. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. *Hornero*, 12 (4): 250-261.
 NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO, 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba*, 56 (1-2): I-IX + 1-114.
 OCHOA DE MASRAMON, D., 1969. Contribución al estudio de las aves de San Luis. *Hornero*, 11 (1): 32-45.
 OLROG, C. C., 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Op. Lilloana*, 27: 1-324.
 PETERS, J. L., 1923. Notes on some summer birds of northern Patagonia. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 65 (9): 275-337.
 TRAYLOR, M. A., 1979. Check-List of birds of the world. A continuation of the work of James L. Peters. 8. *Mus. Comp. Zool., Cambridge, Mass.*
 WETMORE, A. y J. L. PETERS, 1924. A new race of *Spizitornis parulus*. *Auk*, 41 (1): 144-146.

