

CABRERA-31

A. CABRERA

---

## UN NUEVO CÉRVIDO ESPAÑOL



---

Extracto del BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HISTORIA NATURAL.  
Tomo XVI, 1916 (páginas 175-176).

---

MADRID, 1916

## Un nuevo cérvido español

por

Angel Cabrera.

En El Vierzo (provincia de León), ha cazado recientemente el distinguido montero D. Benito Llorente seis corzos, uno de los cuales ha tenido la atención de regalar al Museo Nacional de Ciencias Naturales, y que evidentemente representan una raza geográfica diferente del *Capreolus capreolus canus*, considerado por mí como común a toda la Península Ibérica (1). Comparados con topotipos de *canus* y con otros ejemplares de la Sierra de Guadarrama, todos en pelo de invierno, estos corzos son mucho menos grises, más amarillentos y se distinguen sobre todo por presentar una mancha blanca en la garganta, y otra de forma aproximadamente semilunar, en la parte inferior del pecho. En *C. c. canus* no existen estas manchas, por lo menos bien definidas. Sólo en un ejemplar de las cercanías de Cercedilla (Madrid), he encontrado muy ligeros indicios de la más baja. De las diferentes razas reconocidas hasta ahora en el corzo europeo, estas manchas sólo las tiene bien determinadas el *C. c. transsylvanicus* de la Europa sudoriental; pero en éste el pelaje es grisáceo, como en *canus*. En cuanto a la forma típica del Sur de Escandinavia, cuyo pelo presenta un matiz más amarillo en invierno, carece también de las manchas del cuello, no pudiendo confundirse tampoco con la forma del Vierzo.

A continuación doy la descripción de esta última, que creo es preciso distinguir bajo un nuevo nombre:

### *Capreolus capreolus decorus* subsp. n.

*Caracteres*.—Pelaje de invierno más pálido y más amarillento que el de *C. c. canus*. Los pelos, observados separadamente, son en su mitad basal de un gris de ratón claro (el «pale mouse gray» de Ridgway, *Color Standards*, Pl. LI, 15'''' d), y luego presentan un ancho anillo pardo, otro crema y la punta negra. En medio del dorso, el color general es bastante más oscuro, y todavía lo es más en la frente, entre los ojos, donde es casi negruzco. Una mancha en

(1) *Fauna Ibérica: Mamíferos*, 1914, pág. 330.



forma de rectángulo irregular que ocupa la garganta, y otra semilunar hacia la mitad de la cara inferior del cuello, blancas. Las manchas del hocico, el escudo anal, etc., como en las demás razas.

El cráneo no ofrece ninguna particularidad.

Dimensiones del tipo, medido en carne por mí mismo: cabeza y cuerpo, 1.230 mm.; oreja, 130; pie posterior, 360.

Cráneo: longitud cóndilobasal, 188 mm.; ancho cigomático, 86,4; ancho en los bordes orbitarios, 89,9; nasales, 59,5; mandíbula, 158; serie molar superior, 59; serie molar inferior, 63;  $m^3$ , 12;  $m_3$ , 15. Cuernas (en terciopelo): longitud aproximada, 240; separación en las puntas, 150.

*Tipo*.—Macho adulto, de El Vierzo (León). Museo Nacional de Ciencias Naturales, núm. 16 · II · 18 · 1.

*Observaciones*.—Probablemente *C. c. decorus* es el corzo del rincón nordeste de la Península, si es que no se extiende también por el distrito cantábrico. Para tener una idea, siquiera fuese aproximada, de su distribución geográfica, sería preciso ver corzos en pelaje invernal de Portugal y de Asturias. También convendría examinar ejemplares de El Vierzo con pelo de verano, para apreciar las diferencias que en esa estación puede haber entre *decorus* y *canus*.

