

A la Biblioteca del Museo de la Plata
5.430

AMBROSETTI-

37

MUSEO DE LA PROVINCIA DE ENTRE-RIOS

FAUNA DE ENTRE-RIOS

POR

JUAN B. AMBROSETTI



(Artículo publicado en el Capítulo IV de la DESCRIPCIÓN FÍSICA Y ESTADÍSTICA DE LA
PROVINCIA DE ENTRE-RIOS, por Cayetano Ripoll, hijo).

PARANÁ

TIPOGRAFÍA A VAPOR «PRIMERO DE MAYO»

--- Calle La Paz, n. 12 ---

1887

Fauna de Entre-Rios

La *Fauna Entre-Riana* es numerosa, rica y variada.

Esta provincia rodeada por el Norte y Oeste por las de Corrientes y Santa Fé y por el Este por la Republica Oriental hace que muchas especies de estas rejiones vivan en su suelo transportadas ya sea por los vientos, la continuidad del monte que cubre gran parte de la provincia y se interna en la de Corrientes, las corrientes de agua y los camalotes que son uno de los elementos de dispersion más importantes, debiendose á ellos muchas especies del Paraguay traídas aquí durante la época de las grandes crecientes del Paraná.

El hacer una *Fauna Entre-Riana* completa, es muy difícil, sobre todo tratandose de los grupos inferiores, debido al poco tiempo que hace que se han iniciado las exploraciones científicas; así es que me he concretado á enumerar todos los animales que he observado, coleccionado y que otros autores han señalado de esta Provincia.

ZOOFITOS

De la familia POTÁMOLEPIDAE se halla en el Rio Uruguay un espongiario de agua dulce, *Uruguay coralloides* Cart; de un color que varia desde el gris oscuro hasta el blanco.

ENTOMOZOARIOS

VERMES

PLATHELMINTHES se hallan aunque no muy comunmente las *Tenias*, *medio-canellata*, *T. Solium* L. en el hombre, la *Tenia cenurus* en las ovejas (rara) y en las aves zancudas y muy particularmente en el *Himantopus nigricollis*, Viell (tero real) y todos los de esta familia se encuentra una *Tenia* que aun no he podido determinar, en mas de treinta de estas aves á quienes he examinado la he encontrado. Raro felizmente es tambien el *Distoma hepaticum* que ataca á las ovejas, produciendo la enfermedad conocida bajo el nombre de Duelo del Hígado, que causa tantos estragos en la campaña Sur de Buenos Aires.

Entre los NEMATHELMINTHES citaré el *Ascaris lombricoidalis* (Lombriz) que ataca á los niños, el *Oxyurus vermicularis* mas raro que el anterior.

El *Gordius acridiorum* Weyemb. que tuve ocasión de observar en una Langosta (*Acridium Paranense* Burm) y creo se halle la *Filaria horrida* en el ñandú (*Rhea americana*) que abunda en el Departamento La-Paz, por que varios paisanos me han hablado de una lombriz que han visto en los avestruces que habian cazado.

ROTATORIOS

Al observar al microscopio, algunas aguas de charcos del Departamento de Victoria, observé algunos *Rotiferos* que no pude determinar por falta de obras especiales.

ANELIDOS

Solo he observado un *Hirudinido* que me regalaron vivo del arroyo de Crespo (Victoria) llamado Saguaypé, es mucho mas grande que el *Hirudo officinalis*. El ejemplar se conserva en el Museo de esta Provincia y mas adelante lo estudiaré, ademas se halla el *Lumbricus Argentinus* Weyemb, ó lombriz de tierra.

ARTHROPODOS

CRUSTÁCEOS

En los algibes he visto repetidas veces representantes de los géneros *Cyclops* y *Daphnie*, se halla en el rio Paraná un parásito en el dorado, (*Hydrocyon brevidens* VAL) que es el *Giropeltis Kollarii*; y tambien el *Potamergus platensis* Burm., *Aeglea laevis*, y *Palemon Brasiliensis*.

ARACNIDOS

Son muy abundantes el Dr. E. L. Holmberg quien estudia actualmente esta clase tiene en su poder gran

parte de los que he coleccionado, no obstante señalaré algunos; entre los inferiores se halla el Bicho colorado (*Tetranychus molestissimus* Weyemb.) conozco dos especies de garrapatas una del Perro y otra que ataca á la hacienda vacuna, á veces en tan gran cantidad que en pocos dias quedan estenuadas, sin embargo varias aves se encargan de aliviarlas como ser el Chimango (*Milvago chimango*) el Boyero (*Cassicus solitarius*) y otros.

La Sarna (*Sarcoptes Scabiei* Latr.) suele atacar á las ovejas mal cuidadas.

He hallado algunos *Gonyleptidos*, de escorpiones se hallan dos especies el *Bothriurus vittatus* Thorel y otro que no conozco, he coleccionado tambien algunos Pseudo escorpiones, que creo sean del género *Chelifer* y de arañas he podido constatar las siguientes *Lycosa poliostroma* Koch y otras especies mas, el abundante *Ocypte Pithagorica* Holmb. *Euophrys sutrix* Holmb (comun); la preciosa *Argyopes argentata* Fabr. la *Acrosoma difussum* Walk, *Epeira lathyrina* Holmb., la *Epeira socialis*, Ren, curiosa por su seda consistente y abundante, varias especies de *Theridium*; *Dysdera erythrina* Walk, la *Segestria florentina* Rossi, á la que se atribuyen mordeduras fatales; la *Segestria vulgarissima* Holmb. varias especies de *Migales* llamadas vulgarmente araña pollito; el *Pholcus phalangioides* Walk ó araña de los rincones, la *Omosita bicolor* Holmb. y muchas otras especies que el Dr. Holmberg publicará oportunamente.

MIRIAPODOS

El ciento piés (*Scutigera* sp.) El museo posee cinco especies de *Scolopendra* y dos especies de *Julus* hasta hoy no determinados.

INSECTOS

Entre los **Dipteros** puedo citar los siguientes:

De la Familia MUSCIDAE; *Musca domestica* (importada) *Compsomyia macellaria* F. que produce el agusanamiento en los animales y aveces, aunque muy raro en el hombre (Myasis). *Lucilia* sp.

De la Fam. SYRPHIDAE: los géneros *Syrphus*, *Eristalis*, *Volucella*.

De la Fam. ASILIDAE: *Neomochtherus rufipalpis* E. L. A. *Erax flavidus*. Mcq. *E. singularis*. Mcq. *Mallophora vegeta* E. L. A. *M. ruficauda* Wied (Comun) *Dasypogon* sp. *Allopogon gracile* Big. A. *Vittatus* Schr

De la familia TABANIDAE: *Tabanus albipalpis* T. *trigonophorus*. Mcq. y varias otras especies.

De los STRATIOTOMYIADAE. *Stratiomys* sp. *Odonotomya bucefala* Gerst. *Hermetia illucens* L. *H. rufiventris* Fabr.

La fam. TIPULIDAE, está tambien representada por dos especies.

De los BIBIONIDAE, no conozco sino un *Bibio*, *B. subaequalis*. Rond.; segun el Dr. Burmeister se hallan muchas especies en el Paraná de la fam. MYCETOPHILIDAE.

De la fam. CHIROMIDAE, el *Chiromus Bonaerensis*. E. L. A. y finalmente en los bañados y en las costas de los Rios abundan los representantes de la fam. CULICIDAE de los cuales he visto la *Prosophora ciliata* Burm. el *Culex flavipes* Mcq. y el *Culex mosquito* R. D.

Hemipteros. — Ultimamente se ha encontrado en el Departamento de Villaguay el *Coccus silvestris* Blanch (Cochinilla) ademas he coleccionado, de la fam. MEMBRACIDAE el *Bythoscopus signatus* Stal. *Spanbergiella Felix* Berg. *Athysanus picinus* Berg. *Jassus adspersus* Stal. *Gyponia mystica* Spmb. y otras especies. *Xerophloea viridis* Fabr. *Tettigonia*, *xanthophis* Berg. T.

sagata Sign. *T. Argentina* Berg. *Erichenopa monocerus* Germ., *Ceresa brunnicornis* Germ., *C. malina* Germ. *Ciphonia clavigera* Fabr.—Entre los CERCOPIDAE: *Tomaspis Katzensteinii* Berg. — *T. Entre-Riana* Berg. *T. Knoblauchi* Berg. *T. Argentina* Berg.

De los FULGORIDAE *Ormenis cestri* Berg. *Falcidius lyra* Burm. *Euides fucata* Berg. *Oliarius dimidiatus* Berg. *Poecera amoena* Gerst.

Los CICADIDAE ó chicharras, estan representados por el *Timpanoterpes gigas* Oliv. *T. serricosta* Stal. *Fidicina gastracanthophora* Berg. *F. opalina* Germ. *F. Bonaerensis* Berg.

De los CORISIDAE no conozco sinó la *Corisa forciceps* Spin.

De los NOTONECTIDAE, la *Notonecta variabilis* Fieb.

De los NEPIDAE: la *Ranatra annulipes* Stal; entre los BELOSTOMIDAE la *Belostoma annulipes* H. S. *Zaitha micantula* Stal. *Z. elegans* Mayr, *Z. boops* Duf., *Z. eumorpha* Duf. *Z. Mayri* Berg. *Z. elliptica* Latr.

De los HYDROMETRIDAE *Halobates platensis* Berg.

Los REDUVIIDAE (ó vinchucas vulgarmente) tenemos el *Diaditus semicolon* Stal, *Spiniger femoralis* Stal. La célebre vinchuca *Conorhinus infestans* Klug, muy abundante en los ranchos poco aseados, *Melanolestes Argentinus* Berg. *Rasahus hamatus* Fabr. *Apiomerus lanipes* Fabr. *Cosmoclopius nigro annulatus* Stal. *C. poecilus* H. S. *Atrachelus crassicornis* Burm. De los CIMICIDAE la *Cimex lectularius* L. (importada) ó chinche de las camas comun en algunas casas.

De los CAPSIDAE solo puedo citar el *Miris insuavis* Stal., y al *Phytocoris Argentinus* Berg. los demas no he podido determinarlos aun.

De los PYRRHOCORIDAE he hallado solo el género *Largus* con las especies *lunatus* Fabr. *fasciatus* Blanch y *rustipennis* Lap. son muy comunes.

Fam. LIGACIDAE *Oncopeltus varicolor* Fab. *Ligaeus albo ornatus* Blanch.

Entre los COREIDAE citaré á la *Jadera obscura* West. *J. sanguinolenta* Fabr. *Corizus pictipes* Stal, *C. lugens* Stal, *Harmostes procerus* Berg., *Margus pallescens* Stal. *Acanonicus hahni* Stal. *Sethenira sordida* Berg. *Spartocera brevicornis* Stal. *Phithia picta* Dru. *Leptoglossus impictus* Stal. *Athaumastus haemeticus* Stal. *Crinocerus sanctus* Fabr. *Pachylis Argentinus* Berg. y de los PENTATOMIDAE, *Edessa rufomarginata* Degeer, *E. mediatunda* Fabr. *Arvelius albopunctatus* Degeer *Thyanta aeruginosa* Berg. *Loxa flavicollis* Am. y Serv, *Acedra modesta* Stal, *Oenopia unidentata* Spin, *Dychelops furcatus* Fabr. *Mormidea ipsilon* L. *M. poecilla* Dall, *M. crocipes* H. S. *M. notulifera* Stal *Oxynotus trigonus* Germ. *Mutyca phymatophora* Pal. *Oplomus cruentus* Burm. *Stiretrus septemguttatus* Germ. *Pachycoris torridus* Burm. *Tetyra poecila* Berg. *Thyreocoris longirrostris* Berg. *T. circumfusus* Berg. *T. xanthopus* Berg. *Cyrtomenus, ciliatus* Berg.

Lepidopteros. — Tenemos en el Museo como unas 30 especies de MICROLEPIDOPTEROS que aun no se han estudiado por falta de tiempo y obras

Entre los MACROLEPIDOPTEROS, citaré de la fam. SATURNIDAE: *Ceratocampa Molina* Cram. *C. bilineata* Burm. *Yo liberia* Cram. *Yo viridescens* Walk. *Dirphia consularis* Burm. *Erebus cdora* Cram.

De la fam. ARCTIDAE: *Antarctia vulpina* Burm. *Ecpanteria indecisa* Walk.

De la fam. LITHOSIDAE *Cydonia nobilitella* Cram. *Apistosis Judas* Heub. *Atyria Osiris* Cram. *Yosia mononeura* Heub. *Melanochroa cephise* Cram. *M. clavigera* Walk.

De los PSYCOIDAE, al célebre vicho de cesto (*Oeceticus Kirbii* Guil) que tantos estragos causa en las quintas á veces.

De la fam. GLAUCOPIDAE: *Copaena eriphia* Fabr. *Cha-*

ridea jucunda Walk. *Eurata sericaria* Perty. *E. patagiata* Burm. *E. hermione* Burm. *E. selva* Boisd.

Estas son las mariposas nocturnas que he podido determinar en cuanto á las crepusculares tenemos de la fam. SPHINGIDAE *Protoparce rustica* Fabr. *Spinæ Paphus* Cram. *S. cestri* Blanch. *S. cingulata* Fabr. *S. Justiciae* Walk. *Choerocampa tersa* L. *Philampetus vitis* L. *Ph. Lycaon* Cram. *Ph. Labruscae* L. que se encuentran en las parras y á cuya oruga llaman vulgarmente vicho de parra. *Deilephila euphorbiarum* Guer. *Dilophonota Elio* L.

Entre las Diurnas se pueden señalar de la Fam. HESPERIDAE *Spathilepia evelinda* But. *Phytonides asychis* Cram. *Thymelicus premnas* Walk. Entre los LICAEINIDAE: *Tecla acaste* Cram. *Eurtyulus sanguinalis* Burm.

De la fam. ERYCINIDAE: *Lemonias epulus* Cram. *Emesis diogenea* Pr. *Riodina Lissippus* L. *Zeonia licarsis* Fabr.

Entre los SATYRIDAE: *Euptychia Hermes* Fabr. *E. Celmis* God. *E. phares* God. *E. Spartacus* Burm.

Entre los NYMPHALIDAE: *Morpho epistrophis* Hueb. *Callicore condrena* Hueb. *Eunica margarita* God. *Junonia lavinia* Cram. *Pyrameis Huntera* Fabr. *P. carye* Hueb. *Phycioides Simoi* Hueb. *Euptoeta claudia* Cram. *Agraulis vanillae* L. *Colaneis phaerusa* L. *C. Julia* F. *Eresia janthe* Fabr.

De la fam. HELICONIDAE: *Acraea Talia* L. *Helliconia Phyllis* Fabr. *Methoma Themisto* Hueb.

Fam. DANAIDAE: *Danaus archippus* Fabr. *D. erippus* Fabr. Tenemos además de la fam. PIERIDAE *Pieris Menacte* Bois. *P. Autodice* Hueb. *Colias Lesbia*, *Callidryas cypris* Fabr. *C. eubula* L. *C. argante* Fabr. *C. Fabia* Fabr.; y de la preciosa familia de los PAPILIONIDAE *Euryades Corethrus* Burm. *E. Duponchelli* Luc. *Papilio Perrhaebus* Boisd. *P. microdamas* Burm.

P. Polydamas L. *P. Cleotas* Gray. *P. lycophron* Hueb.
P. Thoas L.

Neuropteros. — Solo puedo señalar tres géneros de *Neuropteros* de la familia LIBELLULIDAE *Libellula* *Lais* Perty. *Agrion* de este género hay como cinco especies y *Aeschna Bonaerensis*, apésar de que de esta familia la coleccion es numerosa; ademas he coleccionado dos ejemplares de la familia PHYRGANIDAE que no he determinado aun.

Ortopteros. — De la familia ACRIDIDAE: *Acridium Paranense* Burm. (Langosta migratoria) *Tropinotus laevipes* Stal. *Grea horrida* Ph. *Dichroplus vittiger* Berg. *Cephalocoema costulata* Burm. *Romalia speciosa* Stal. *Truxalis brevicornis* Burm. *Pezottetix Bergii* Stal.

De la familia LOCUSTIDAE: *Xiphidium vitticollis* Blanch. *Xiphocera viridicata* Serv., y otras especies mas.

De la fam. GRYLLIDAE: *Grillus argentinus* Sauss. *Scapteriscus didactylus* Sauss.

De la familia PHASMIDAE he coleccionado muchos ejemplares de los géneros *Bacillus* y *Bacteria*.

La fam. MANTIDAE ó mamboretas, tiene muchos representantes de los géneros *Mantis*, *Coptopteryx* y otros.

De la fam. BLATIDAE: *Ischnoptera Brasiliensis* Burm. *Blatta Germanica*, *Periplaneta Americana* Burm. *P. Orientalis* Burm. *Blabera servicola* Serv.

De la fam. FORFICULIDAE el museo posee varios ejemplares entre ellos la *Labidura riparia* Pall.

Coleopteros. — De la fam. COCCINELIDAE (vaquitas de San Antonio vulgarmente) *Eriopis conexa* Germ. *Megilla quadrifasciata* Muls. *M. octodecimpustulata* Muls. *Coccinella ancoralis* Germ. *Calvia dentatofas-*

ciata Burm. *Psyllobora confluens* Fabr. *Daulis sanguinea* L. *Epilachna paenulata* Germ. *Exoplecta fulgarata* Burm.

De la fam. CRYSEMELIDAE: *Diabrotica speciosa* L. *Morphoides bilineatus* Germ. *Cryptocephalus* Sp. *Omo-plata flava* Boh. *Peocilaspis angulata*, *Mesomphalia* Sp. *Zigogramma virgata* Stal. *Calligrapha* Sp. *Mettalactus patagonicus* Suffr. *Phaedon* Sp. etc.

De la fam. LONGICORNIA: *Amphionycha Petronae* Burm. *Acanthoderes congener* Burm. *Oncoderes guttator* Fabr. *Oximerus obliquatus* Burm. *Trachyderes morio* Fabr. *T. variegatus* Perty, *T. striatus* Fabr. *Dorcacerus barbatus* Oliv. *Clytus acutus* Germ. *Chrysoprasis aurigena* Serv. *Eptenon basale* Burm. *Compso-cerus equestris* Guer. *Thicophorus albomaculatus* Burm. *Eburia quadrolineata* Burm. *Hammatochaerus batus*, L. *Achryson maculatum*, Burm. A., *undulatum*, Burm. *Calocomus*, *Desmarestii*, Fairm. *Malloodon spinibarbis*, L.

De la fam. CURCULIONIDAE no he coleccionado sino dos especies del género *Naupactus* (*N. Durius* Boh. *N. Leucoloma* Coh.) nuevos descubrimientos nos darán á conocer, muchas otras especies que no dudo se hallen en Entre-Rios.

De la fam. ELATERIDAE: El lindo buprestido comun, *Psyloptera Tucumana* Guer. *Thyлаuchenia crassicollis* Gori. *Chalcolepidius limbatus* Esch. *Monocrepidius scalaris* Germ.

De la fam. LAMPIRIDAE: *Coleopteron laticornis* Fabr. *Cratomorphus diaphanus* Germ.

De la fam. CANTHARIDAE: *Lytta vittigera* Blanch. *L. aspersa* L. (vicho moro) y *Horia maculata* Swev.

De la fam. MELASOMATA: *Scotobius clathratus* Guer. *S. miliaris* Bill. *Tenebrio obscurus* Fabr. *Camaria pulcherima* Berg. *Lobopoda pallicornis* Fabr.

De la fam. LAMELLICORNIA: *Onthophagus* Sp. *Pha-neus imperator* L. *Ph. mito* Dej. *Ph. menalcas* Dej., á

estos tres últimos se le dá, el nombre de catangas—*Gromphas Lacordairii* Dej. *Copris* Sp., *Aphodius ster-
corator* Fabr. *Trox suberosus* Fabr. *T. aeger* Guer.,
he coleccionado además otra especie de *Trox*. *Phile-
reus vevex* Burm. *Diloboderus abderas* Str (Torito vul-
gar) *Rotela* Sp. parecida á la *R. Lineola* quizás la mis-
ma, *Leucotyreus lateralis* etc.

De la fam. DERMESTIDAE: La célebre polilla de los
cueros—*Dermestes vulpinus*, L.

STAPHYLINIDAE: *Pinophilus mayor* Blanch. *P. fulvi-
pes* Erich, *Lithocharis ochracea* Lacord. *Cryptobium
basale* Blanch. *Phyllonthus pallidipes* Blanch. *Sta-
philinus fuscicornis* Germ. *Creophilus variegatus* Dej.
Haematodes bicolor Lap.

De la fam. PALPICORNIA: *Tropisternus glaber* Krt.
Hydrophylus palpalis Brull. *H. ater* Oliv. *Megadytes
glaucus* Brull.

De la fam. CARABIDAE: *Calosoma Bonaerensis* Dej.
Anisodactylus cupripennis Lac. *Chlaenius oblongus* Dej.
Agonium lineo-punctatus, Dej. *Scarites antracinus*, Dej.
Lebia rhyticrania Chand. *Gallerita ruficollis*, *Brachy-
nus intermedius*, *B. vicinus* Dej. *Cicindela sinuosa*,
Brulle. *Cicindela apiata* Dej., los demas no los he de-
terminado aun.

Himenopteros. — Entre los ICHNEUMONIDOS citaré los
gen. *Ophion* (comun) *Ichneumon*, *Pimpla* etc.

De la fam. CHRYSIDAE NO CONOZCO sino la *Chrysis fas-
ciata* Fabr.

De la fam. FORMICIDAE (hormigas) he reunido una
buena coleccion que por falta de tiempo aun no se ha
estudiado.

De la fam. MUTILIDAE, se han señalado de esta pro-
vincia las siguientes especies *Mutila corpulenta* Gert.
M. trinacria Gert. *M. fronticornis* Burm. *M. crassipes*
Burm. ú *Pythagorea* Gert. *M. hoplites* Gert. *M. pre-*

tiosa Gert. *M. minima* Burm. *M. duplicata*, *M. haematodes* Gert. *M. sumtuosa* Gert.

De la fam. SPHEGIDAE: *Sphex micans* Tasch. *Priononyx Thomae* Dalb. *Pr. bifoveolata*, *Pr. Striata* Smit.

Entre los POMPILITES *Pompilus gastricus* Spin. *P. scalaris* Klug. *P. erubescens* Tasch. *P. semicinctus* Klug. *P. phaleratus* Perty. *Prionocnemus dumosus* Burm. *Pr. rufofemoratus* Tasch. *Pepsis Reaumurii* Dalb. *P. aciculata* Tasch.

Entre los CRABRONIDOS: *Monedula carbonaria* Burm. *Bembidula discisa*, Gest. *Trypoxylon palliditarse*, Sauss.

De la fam. EUMENIDAE al *Odynerus Argentinus* Sauss.

Entre los VESPIDOS: *Polybia occidentalis* Sauss. *P. atra* Sauss., *P. sericea*, *Polistes cavapyta* Sauss. *Nectarina Lecheguana* Latr. etc. (avispa lechiguana) y entre los APIDOS: *Coelioxys coloboptycha* Holmberg. *Megachile* Sp. *Halictus* Sp. *Augochlora* Sp. *Xylocopa augustii* (mangangá) Fabr. *X. Brasilianorum* Tasch. *X. Splendidula* Fabr. *Centris vulpecula* Burm. *Bombus thoracicus* Sichel, *B. violaceus*, St. Farg. *Epelecisca Curcubitae* Holmberg, *Melipona* Sp. *Apis mellifica* L. (importada) abeja comun, etc.

MOLUSCOS

LAMELLIBRANCHIA

Los Lamelibranquios, son abundantes en nuestras aguas, se encuentran las siguientes especies: *Cyclas Paranaensis* D'Orbig. *C. obsoleta* Deach. *Iridina trapezoidales* D'Orbig. *I. georgina* Gray. *I. Castelnaudii* Hupe. *Castalia ambigua* D'Orbig. *Unio Paranaensis* Lea. *U. deltodontes* Lam. *U. Charruanus* D'Orbig. *U. psamoicus* D'Orbig. *U. Burroughianus* Lea. *U. parallepipeton* Lea. *U. Wymani* Lea. *U*

funeralis Lea. *U. nocturnus* Lea. *U. gratus* Lea. *U. paraeformis* Lea. *U. piceus* Lea. *U. piger* Lea. *U. uruguayensis*, Lea. *U. Aethiops*, Lea. *U. disculus*, Lea. *U. lepidus*, Lea. *Monocondylaea Paraguayana*, D'Orbig. *M. perchappi*, D'Orbig. *Binodonta Paranaensis*, D'Orbig. *Anodonta sirionos*, D'Orbig. *A. exotica*, Lam. *A. porcifera*, Gray. *A. mortoniana*, Lea. *A. laterimarginata*, Lea. *A. Uruguayensis*, Lea. *A. forbesiana*, Lea.

GASTEROPODA

PECTINIBRANCHIA. Entre los de la division AMPHIBIA citaré el *Ceratodes cornuarietis*, D'Orbig. *Ampullaria neritoides*. D'Orbig. *A. scalaris*, D'Orbig. *A. canaliculata*, D'Orbig. *A. insularum*, D'Orbig. *A. spixii*, D'Orbig. *A. roissyi*, D'Orbig. *A. pulchella*, Aut. *Ampulloidea platae*, D'Orbig; y entre los LITTORINOIDEA á la *Palustrina petitiana*, D'Orbig.

PULMONATA. Entre los de la division FLUVIALIA al gen. *Chilina*, Sp., y *Planorbis peregrinus*, D'Orbig. *P. anatinus*, D'Orbig., y á la division TERRESTRIA: *Pupilla microdonta*, D'Orbig. *Borus oblongus*, Mull. *Bulimus striatus*, Spix. *B. dentatus*, Wood. *B. Alvarezii*, D'Orbig. *B. montivagus*, D'Orbig. *B. fournierii*, D'Orbig. *B. oblongus*, Mull. *Helix lactea*, Mull. *Hellicella hylephila*, D'Orbig. *Succinea meridionalis*, D'Orbig. *Omalonyx unguis*, D'Orbig. *Vaginulus Paranaensis*, Burm. *Agriolimax Argentinus*, Strobel. *Limax variegatus*, Drap.

VERTEBRADOS

PESCES

Los rios Paraná y Uruguay son abundantes en peces. La coleccion del museo es rica pero su estudio ofrece muchas dificultades sobre todo en un establecimiento nuevo como este.

Su importancia industrial es grande; se hallan establecidas en las islas de esta Provincia numerosas pesquerías que se ocupan en la elaboración del aceite de pescado del que se consumen considerables cantidades en las plazas de Buenos-Aires y Rosario para la fabricación de jabón etc.

Entre los más comunes citaré:

Selachii. — De la familia RAGIDAE, se halla en el río Paraná una especie de *Rhinobatus* (Raya)

Teleostei. — Entre los *Teleosteos* la fam. SILUROIDAE es la mejor representada, entre estos se pueden citar: *Loricaria cataphracta* L. *Hypostomus* Sp. *Callichthys punctatus* Val, estos tres se denominan vulgarmente con el nombre de viejas del agua, *Pimelodus sapo* Val, (Bagre sapo) *Pimelodus pati* Val, (Pati) *Pimelodus mangurus* Val (Manguruyú) *Bagrus commersonii* Val (moncholo) además se hallan otros tres que no he podido determinar aun, como ser, el surubí, el armado, y el amarillo etc.

De la fam. SALMOIDAE *Hydrocyon argentium* Val, *Hydrocyon brevidens* Val (Dorado) *Pacú nigricans* Val (Pacú), *Macrodon trahira* Mull. (Dentado ó tararira) *Sternachus virescens* Val (machete) *Tetragonopterus scabripinnis* Jen. (mojara) *Osmerus* Sp. (pejerrey).

De los PLEURONECTOIDEA, he pescado muchas veces el *Achirus Lorentzii* Weyemb. (Lenguado).

De la fam. ANGUILLOIDAE el *Symbranchus pardalis* Val. (anguila) y últimamente regalaron al museo una especie de *Fisularia* (BLENOIDAE), pescado en el río Paraná.

AMPHIBIOS

De la familia de los SAPOS, es abundante el *Bufo aqua* Latr. Se hallan muchas especies de ranas, entre

ellas, la *Hyla agrestis* Bell, y no es raro el escuerzo *Ceratophrys ornata* Bell.

REPTILES

Entre los **Ofidios** y de la fam. CROTALIDAE se hallan el *Crotalus horridus* L, vívora cascabel y las vívoras de la cruz mas comunes que la anterior representadas por el *Bothrops alternatus* Dum. *Bothrops atrox* L.

De la fam. ELAPIDAE se encuentran varias especies llamadas vulgarmente vívoras del coral, por sus colores vivos entre los que predomina el rojo.

De la fam. PYTHONIDAE á veces se halla, aunque muy raro en el Departamento La-Paz una especie de Boa : *B aquatica*.

Entre los COLUBRIDAE son comunes: *Dryophylax Olfersii* Sch. (vívora verde, azul) *Liophis reginae* L. *Liophis merremii*, *Coronella pulchella* Bibr. etc.

Entre los **Saurios** de la familia AMPHISBENIDAE : la *Amphisbaena fuliginosa* comun (vívora ciega) y de los SCINCOIDAE : *Ophiodes striatus* Wagl (comun).

De los LACERTIDAE el *Acrantus viridis* Wagl (Teyú).

De la fam. IGUANIDAE, la iguana, *Podinema Teguxin* Wagl.

El órden de los **Cocodrillos** solo está representado por nuestro Yacaré *Alligator Sclerops* L, relativamente comun en las islas y á veces se halla el *A. Latirrostris* Burm.

Del órden **Quelonidos** no conozco sino dos especies de la familia EMYDAE, *Platemys Hilarii* Dum. y *Hydromedusa Maximiliani* Mikan (Tortugas vulgar) comunes en los arroyos.

AVES

BREVIPENNES, *Rhea americana*, Briss. (ñandú, avestruz vulgar).

PALMIPEDOS: Fam. BRACHIPTEROS: *Podiceps dominicus* Spix (macasito) *P. bicornis* Licht (macà).

Familia LLAMELIROSTRES: *Anas peposaca*, Viell. *A. Brasiliensis*, Gm. *A. torquata*, Aut. *Querquedula maculirostris*, Licht. *Daphila spinicauda*, Viell. *Carina moscata*, *Sarcidiornis regia*, Lath. *Cygnus coscoroba*, Lath. (pato ganzo). *Cygnus nigricollis*, Lath. (cisne pesquezo negro).

Familia LONGIPENNES: *Rhynchops nigra*, L. *Sterna argentea*, P. Wied. *S. magnirrostris*, Licht. *Larus maculipennis*, Licht. *Larus vociferus*, Gray. (gaviotas).

GRALLATORES. Entre los RALLIDES: *Parra Jacana*, L. *Fullica armillata*, Viell. *Gallinula galeata*, P. Wied, (gallareta). *Aramides gigas*, Spix.; de los SCOLOPACIDOS: *Vanellus Cayenensis*, L. (Teru-teru) comun. *Himantopus nigricollis*, Viell. (Tero real). *Totanus melanoleucus*, Licht. *Ibis chalcoptera*, Temm. (Cuervo). *Ciconia maquari*, L. (Teyuyú). *Tantalus loculator*, L. (Cigueña). *Ardea nivea*, Licht. (Garza blanca). *A. sibiratrix*, Temm. *A. cerulea*, L. *A. cocoi*, L. *A. leuce*, Ill. (Garzas vulgar). *Spatula platalea*, Aut. (Garza cucharona): además tenemos dos especies de ALECTORIDEOS, el Chaja, *Palamedea chavaria*, Ill., y la Chuña, *Dicholophus Burmeisterii*, Harth.

GALLINACEAS. Abundan las Perdices. *Nothura maculosa*, Temm. *Rhynchotus rupescens*, W.

PALOMAS son comunes, la *Columba maculosa*, Temm. *C. picui*, Temm. *Zenaida maculata*, Bon.

RAPTORES. Entre los nocturnos el rey de los pajaritos ó caburé (*Glaucidium ferox*, Bould), el *Bubo crassirostris*, Viell. (Lechuzón) el Nacurutu (*Bubo magellanicus*, Gray.), y la Lechuza de las viscacheras (*Speotito cunicularia*).

De los VULTURIDOS: *Cathartes foetens*, Ill. (Cuervo de las osamentas).

Entre los ACCIPITRINI: *Hemierax circumcinctus*, Kaup. *Falco femoralis*, Temm. *F. sparverius*, L. *Asturina rutilans*, Licht, *Buteo tricolor*, *Rosthramus hamatus*, Ill. *Elanus leucurus*, Bp. A todos estos se les da, vulgarmente el nombre de Gavilanes; el Aguila: *Harpya coronata*, el Carancho, *Polyborus vulgaris*, Viell., el Chimango. *Milvago chimango*, Meyen.

PAJAROS. — De la familia HIRUNDINIDAE: La Golondrina, *Progne domestica*, Gray. *Cotyle tapera*, Bon. *Cotyle leucorhoa*, Viell.

De la familia CAPRIMULGIDAE: *Podager nacunda*, Viell. (Dormilón). *Hydropsalis psalurus*, Tem. *Antrostomus longirostris*, Bon. *A. parvulus*, Gould.

Entre los HALCYONIDAE, los martin pescadores, (*Megaceryle torquata*, L. *Chloroceryle amazonica*, Lath. *Ch. americana*, L.

Entre los FRINGILLIDAE: *Chrysomus frontalis*, Bon. *Leistes anticus*, Bon. *Amblyramphus ruber*, (Juan Soldado). *Trupialis guianensis*, Bon. *Chrysomitris magellanica*, Bon. *Sycalis luteiventris*, Bon. *Zonotricha matutina*. Bon. (Chingolo, Cachila). *Envernagra platensis*, Bon. *Poospiza melanoleuca*, Bon. *Gubernatrix cristatella*, Bon. *Trachyponus capitatus*, D'Orbig *P. aroaria cucullata*, Bon. (Cardenal). *Saltator aurantirostris*, Bon. *Tanagra striata*, Gm. [Siete colores]. *Tanagra*, Sp.

De la familia ICTERIDAE: *Cassicus solitarius*, Viell. (Boyero). *C. albirostris*, Viell. *Molothrus sericeus*, Licht. *M. badius*, Cab.

De la fam. COLAPTERIDAE *Taenioptera moesta* Lich, *T. coronata* Viell, *T. nengeta* Bon *Centritis rufa* Gm, *Lichenops perspicillatus* Bon (viudita) *Triceus margaritiventris* Lafr.

Pirocephalus parvirrostris Gould. (Churrinche) *Serpophaga nigricans* Gould, *S. suberistata* Vieill, *Elaena modesta* Bon, *Tyrannus violentus* Vieill, (Tigereta) *Saurophagus sulphuratus* Bon (venteveo).

Entre los MUSCICAPIDAE, el zorsal *Turdus rufoventris* Licht, *T. erotopesus* Ill.

De la fam. LIOTRICHIDAE, *Troglodytes platensis* Bon, (Tacuara ratona) *Mimus calandria* Bon (calandria).

Entre los TROCHILIDAE solo conozco el *Heliomaster angelae* Less (pica flor).

De la fam. ANABATIDAE, *Nasica gracilirrostris* Burm. *Furnarius rufus* D'Orb (Hornero) *Synallaxis humicola* D'Orb., *S. ruficapilla* Vieill, *S. phryganophilla* Viell, *S. striaticeps* D'Orb., *Sphenopyga acuticaudatus* Bon, *Phacellodomus frontalis* Lafr. *Anabates gutturalis* Lafr.

TREPADORAS—De la fam. PICIDAE *Dendrobates cactorum* D'Orbig., *D. maculatum* Vieill, *Chrysoptilus melanochorus* L. *Colaptes campestris* Mall. (carpinteros) y de la fam. PSITTACINI, la cotorra *Conurus murinus* Gmel, *C. fugax* Burm.

MAMÍFEROS

Del orden de los MARSUPIALES solo tenemos un género con tres especies *Didelphys Azarae* Tem. (comadreja) *D. crassicaudata* Desm. *D. brachyura* Schen.

Del orden de los EDENTADOS: *Praopus hybridus* Burm. (Mulita) *Dasypus villosus* Desm. (Peludo) y muy raramente puede notarse en los Departamentos del Norte el *Oso hormiguero* (*Mirmecophaga jubata* Lineo).

Del orden de los PORCINOS, en el Departamento de La-Paz se halla el Pecari ó chancho de monte (*Dicotyles torquatus* Cuv.)

Del orden de los RUMIANTES, encuéntrase el *Cervus simplicicornis* Illig. (Guazubirá) el *C. Rufus* Illig. y el *C. Paludossus* Desm. (Ciervos).

El órden de los ROEDORES es uno de los que tiene mas representantes en Entre-Rios, podemos citar las siguientes especies *Gavia Leucopyga* Brandt., (conejo de los cercos, ó aperiá), *Hydrochoerus capybara* Erx (carpincho) el mas grande de los roedores actuales, y el que mas abunda en los lugares paludosos, donde se le hace una caza activa, con el objeto de utilizar su piel para la fabricacion de monturas en los centros fabriles.

Lagotomus trichodactylus Brook (Viscacha) roedor abundantísimo en algunos campos de la Provincia, de piel resistente y pelo fino, el industrial Sr. Muste de Victoria ha sabido utilizar la piel de este animal para la fabricacion de calzado etc., habiendo comprobado en la Exposicion de Entre-Rios, la resistencia que tiene este cuero en dichas confecciones, con lo que el Sr. Muste, ha prestado un servicio grande á la Provincia, pues hasta ahora no servia mas que para perjuicio y dentro de poco constituirá una industria.

Ctenomys Brasiliensis Blan. (Tuco-Tuco) he observado perteneciente á este género un ejemplar negro, que parece ser una variedad nueva.

Myopotamus coypus Molina (Nutria) roedor muy abundante en las costas de los rios é islas, donde se les hace una viva caza, con el objeto de utilizar su cuero para la fabricacion de sombreros, que tiene un valor muy estimado, constituyendo uno de los artículos valiosos de comercio de esta Provincia que exporta anualmente grandes cantidades.

Ademas el *Reithrodon tipicus*, Water, el *Hesperomys arenicola* Wat., el *H. bimaculatus* Wat, el *Mus tectorum* Savi y el *Mus Musculus* L. (importado).

Del órden de los CARNIVOROS y de la familia MUSTELINAE las especies siguientes: *Lutra paranensis* Reng (Lobito) muy buscado por su piel, *Mephytis suffocans* Illig. (Zorrino) *Galictis vittata* Schr. (Uron)

De la familia CANIDAE: *Canis Azarae* Pr. Wied (zorro).
Canis cancrivorus Desm., *Canis jubatus* Desm. [zorro
aguará].

De la familia FELIDAE *Felix Pagero* Azara, *Felix
Geoffroyi* D'Orb. [Gatos monteses] *Felix concolor* L.
[Leon puma] *Felix onça* L. [Tigre ó Yaguareté].

Del orden QUEIROPTEROS, se hallan en la Provin-
cia las siguientes especies: *Vesperugo nigricans*, Pr.
Wied, *Atalapha Bonaerensis*, Less. *Dysopes naso*, Wagn.

Entre los PRIMATOS, habitaron este suelo, el *Homo
sapiens*, L., *Var Americana*, representada por las
Tribus *Minuanes* y *Charruas*, hoy estinguidas, cu-
yos restos se encuentran frecuentemente en diver-
sos paraderos y cementerios situados generalmente
en las costas de los rios é islas; principalmente en
el arroyo Nancay, departamento de Guallegaychú; y
la isla del Ceibal frente á la ciudad de Victoria, án-
tes Matanzas: nombre dado por los Españoles por
haber sido el lugar donde fueron destruidos los últi-
mos Minuanes que habian sobrevivido á la conqui-
sta: víctimas de la ley fatal de la lucha por la vida.